


62.53



FREILANDKULTUREN BLÜTENSTAUDEN

ARNOLD VOGT . GARTENBAU

Tel. 910.347 **ERLENBACH-ZÜRICH** Postcheck VIII 9958

FREILANDKULTUREN

Winterharte Blütenstauden

Zwerg- und Felsensträucher

Deck- und Blütensträucher

Schling- und Kletterpflanzen

Zwiebelgewächse

Felsenpflanzen

Alpenpflanzen

Zwergkoniferen

Farnkräuter

ARNOLD VOGT - ERLENBACH-ZCH.
TELEPHON-NR. 910.347

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit der Erteilung einer Bestellung erkennt der Besteller die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Die Preise verstehen sich in Schweizer Währung, netto, ohne Abzüge, franko Gätnerei, Rollgeld und Fracht zu Lasten des Käufers. Körbe und Kisten werden zum fakturierten Preise zurückgenommen, wenn dies auf der Faktura extra. vermerkt.

Die Verpackung wird sorgfältig ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, wird ohne Vereinbarung nicht zurückgenommen.

Wenn keine Bestimmungen über die Versendungsart bestehen, so wähle ich den am vorteilhaftesten Weg. Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Bestellers.

Zum Versand gelangen nur kräftige Pflanzen. Für das Anwachsen kann keine Garantie übernommen werden, es sei denn, dass die Anlage von mir gepflanzt und unterhalten wird. Für Sortenechtheit wird volle Garantie gewährt, bis zur Höhe des fakturierten Betrages, darüber hinaus gehende Forderungen werden abgelehnt.

Wenn bei der Bestellung nicht „Ersatz verboten“ vorgemerkt ist, werde ich mir erlauben, allfällig fehlende Arten durch andere gleichartige und gleichwertige zu ersetzen.

Die Zahlung hat innert 60 Tagen zu erfolgen, und bitte ich, mein Postcheckkonto, Zürich VIII 9958 zu benutzen. Sconto- und Portoabzüge nicht gestattet.

Kleine Beträge und Lieferungen an unbekannte Besteller per Nachnahme, wenn keine andere Vereinbarung vorliegt.

Reklamationen sofort nach Empfang der Ware, unter genauer Angabe der Mängel.

Zur gefl. Beachtung.

Diese Sortenliste ist zu bescheiden im Umfang, um erschöpfende Ratschläge punkto Pflanzung und Pflege zu geben. Für diese, dem Gartenliebhaber täglich auftauchenden Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an mich, es wird mir immer ein Vergnügen sein, mit gutem Rat zur Seite zu stehen.

Neuanlage, Unterhalt, Umänderungen, Pflanzungen werden prompt ausgeführt. Referenzen zu Diensten.

Skizzen, Pläne, Bepflanzungstabellen für Staudenrabatten, Kostenvoranschläge.

Inhalt: Seite 3—54 Blütenstauden, Alpen- und Felsenpflanzen
„ 54—57 Zwiebelgewächse
„ 57 Winterharte Freilandfarne
„ 58—63 Gehölze, Zwergsträucher, Deck- u. Blütingehölze
„ 63 Zwergkoniferen
„ 64 Schlingende und Klettergehölze.

A. Blütenstauden, Alpen, -Trockenmauer- u. Felsenpflanzen.**Acaena** — Stachelnüsschen — Rosaceae —

Aus Neuseeland eingeführte, kriechend-rasenbildende Felsenpflanzen, raschwachsend, für sonnige und halbschattige Lage, rotbraune Blütenköpfchen, vom Juli bis August, unpariggefiederte Blättchen

- **Buchanani**, silbergrüne Belaubung, 10 cm
- **glauca**, blaugrün-silbrige Belaubung, 10—15 cm
- **Novae-Zelandiae**, Pendant zu Buchanani, braune Blättchen, 10 cm
- **reptans**, blaugrünes Laub, sehr raschwachsend, zum Ausfüllen und Ueberwachsen grosser Flächen, 15 cm
- **Sanguisorbae**, wie Novae-Zelandiae, aber in allen Teilen robuster

Acantholimon — Igelpolster — Plumbaginaceae (Syn. Armeriastrum.)

Starre, dichte, immergrüne Polster, für sonnig-steinige und trocken-heisse Lage. Wertvolle Trockenmauerpflanze. Blüten in zierlichen Aehren. 10—15 cm. Juni—August

- **graminifolium**, dunkelrosa, hellgrüne Polster
- **lepturoides**, rosa
- **venustum**, blaugüne Nadelblätter, typischer Vertreter der Gattung

Acanthus mollis latifolius — Bärenklau — Acanthaceae.

Dekorative Blattstauden, am besten halbschattige Lage und humoser Boden, bis 100 cm hohe Blütenschäfte, rötlich angelaufene Helmb Blüten. Wirkungsvoll als Einzelpflanze

Achillea — Schafgarbe — Compositae — Körbchenblütler

- **aizoon** (Syn. *ageratifolium*), die silberweissen Blattrosetten bilden ein dichtes immergrünes Polster, Blüten weiss, 20 cm. Juni—Sept.
- **atrata**, Einheimische Alpine mit grossblumigen weissen Blütenständen, schwarzgrüner Hüllkelch. 10 cm. Juni—August
- **aurea**, silberigbehaarte feingesägte Blätter, schwefelgelbe Blüten-dolden, 20 cm. Juni—September.
- **Clavennae**, weissfilzige Schafgarbe unserer Tessiner Alpen. 10—15 cm. Sonnige Lage und durchlässiger Boden, weiss kalkliebend
- **filipendula** „Parkers Variety“. Hervorragende Schnitt-, wie Schmuckstauden, gelbe flache Blütendolden, von Juni—Oktober, 120 cm
- **grandifolia**, 60 cm, weiss, Juli—August
- **hybrida** „Rigi“, hell-schwefelgelbe Blütendolden niederliegend-aufstrebend, 30 cm. Juni—September
- **Kolbiana**, tiefgebuchtete, weissfilzige Blätter, weiss, 10 cm. Juli
- **Kellereri**, feingesägte, lange, silberweisse Blätter, Blüten reinweiss, 20 cm. Juni—August
- **millefolium** „Cerise Queen“, Abart unserer Wiesenschafgarbe, dunkel-kirschrote Blütenstände, dankbarer Blüher, Juni—Sept. 50-60 cm
- **millefolium** *Kelwayi*, karminrot
- **moschata**, stark fiederschnittige Blätter, weiss, als Heilpflanze und zur Bereitung von Liqueur als Yvapflanze bekannt, kalkscheu
- **pseudo-umbellata**, weissfilzig, Blüten weiss, 10 cm, Juli
- **ptarmica** fl. *pl. Boule de Neige*, reinweiss gefüllt, 50 cm. Juni—Sept.
- — — **Perrys White**, wie Vorige, robuster, grosse Einzelblumen

Achillea ptarmica fl. pl. **The Pearl**. Die zierlichste der drei angeführten ptarmica Sorten. Alle drei treiben unterirdische Ausläufer, müssen also von andern Stauden genügend Abstand halten

- **serrata** fl. pl. Aehnlich der Vorigen kräftiger im Wuchs. Blütezeit 14 Tage früher, weiss gefüllt
- **-Schreinerii**, tiefgesägte weissgrüne Blätter, Blüten weiss, Juli—August, 15 cm
- **taygetae hybrida**, olivgrüne feine Blätter, hellschwefelgelbe Blütenstände, für Alpinum und Staudenrabatte, 40 cm. Juni—September
- **tomentosa**. Eine der besten Arten für Alpinum, Trockenmauern und Bordüren. Zottigwollige-saftiggrüne Belaubung, leuchtend goldgelbe Blütendolden, 20 cm. Juni—Oktober
- **umbellata**, ganze Pflanze weissfilzig, Blüten reinweiss, 10 cm

Aconitum — Eisenhut — Ranunculaceae — Hahnenfussgewächse.

Prächtige Rabattenstauden, Einzelpflanzen oder als Zwischenpflanzung in Gehölzgruppen. Nicht zu schwerer Boden, am besten Halbschatten

- **autumnale**, mittelhohe Sorte mit grossen Einzelblumen, lichtblau
- **Fisheri**, niedrig mit glänzenden Blättern und hellblauen Blumen, beide Sorten September—Oktober
- **lycocctonum pyrenaicum**, gelb, 60—70 cm. Juli—August
- **Napellus**. Einheimischer blauer Eisenhut unserer Bergwälder, 80 cm
- — **album**, weisse, etwas rötlich angelaufene Blüten
- — **bicolor**, blau mit weiss
- — **carneum**, rosa
- — **praecox**, tief-dunkelblau
- — **paniculatum**, verzweigte, hellblaue Blütenstände
- **Sparks Variety**, hohe Art mit eleganter blauer Rispe, 120—140 cm
- **volubile**, blau
- **Wilsonii**, bis 180 cm hoch, die spätblühendste Art, lichtblau, September—Oktober

Adenophora Bulleyana — Becherglocke — Campanulacea — 60 cm hoch, hellblaue Glockenblüten, halbschattig, Juni—Juli

Adonis vernalis — Adonisröschen — Ranunculaceae —

Eine der ersten Frühlingsblumen, feinfiederige Blätter, goldgelbe Sternblumen. März—April. 15 cm

Aethionema — Steintäschel — Cruciferae.

Zierliche Halbsträuchlein fürs Alpinum, 15—20 cm hoch

- **pulchellum**, hellrosa
- **grandiflorum**, zartrosa, blaugrüne Blättchen

Aetheopappus pulcherrimus. Kaukasische Kornblume — Compositae

Blüten silberigrosa, ähnlich einer grossen Kornblume, feine Schnittblume, Juni—Juli, 60 cm

Ajuga reptans metallica multicoloris, Kulturform des kriechenden Günsels, Blätter rotbraun, mehrfarbig marmoriert. 10 cm, Juni—September
Blaue Blütenähren

Alchemilla — Silbermantel — Rosaceae.

- **alpina**. Unterseite silberig behaart, Blüten unscheinbar. Juli-Sept.
- — var. **alpestris**
- — — **conferta**

Allium (siehe Zwiebelgewächse)

Alsine — (siehe auch *Arenaria*) — Sandkraut — Caryophyllaceae.

Rasige und polsterbildende Alpinen aus der Familie der Nelken-
gewächse, durchlässiger Boden und feuchter Standort

- **juniperina**, graugrüne Nadelblätter, weisse Blütensterne, immergrün,
10 cm. Juli—August
- **laricifolia**, rasenbildend, Blätter hellgrün, 15 cm, Juli
- **pusilla**, die grundständigen Blattrosetten vereinigen sich zu einem
dichtrasigen Polster, 8—10 cm, weiss
- **rigida**, moosähnliches Polster, 8—10 cm, weiss
- **liniiflora** (Syn. *Bauhinorum*) lockeren Rasen bildend, Blüten gross,
weiss, 10 cm, Juli—August
- **graminifolia** (syn *Rosani*) dunkelgrüne Polster, 8 cm
- **verna fl. pl.**, moosartiges Polster, Blüten weiss gefüllt

Alstromeria — Inkalilie — Amarylidaceae

Lilienähnliche Pflanzen, die orangefarbenen Blüten in Dolden

- **aurantiaca**
- — **splendens**

Althaea rosea ficifolia fl. pl. — Stockrose — Malvaceae

die bekannte Stockrose aus unsern alten Gärten, weiss, gelb, rosa,
rot, scharlach, blutrot, gefüllt, an bis zu 250 cm hohen Schäften.
Lieferung mit Topfballen

Alyssum — Steinkraut — Cruciferae

- **argenteum**, Halbsträuchlein, silbriggrüne zierliche Blätter, 25 cm, die
gelben Blütendolden im Mai—Juni.
- **calycinum**, niederliegend ausgebreitet, goldgelb, Mai—Juni
- **Moellendorffianum**, kriechend, silbergraue Blätter, Blütendolden
goldgelb, 8 cm, Mai—Juni
- **montanum**, sattgelb, 10—20 cm, Mai, blüht gerne im Herbst zum
zweiten Mal
- **saxatile compactum**, bringt im April—Mai eine Fülle goldgelber
Blüten, 30 cm
- — **citrinum**, Blüten hellschwefelgelb
- — **flore pleno**, goldgelb gefüllt
- **serpyllifolium**, niederliegend, kriechend, goldgelb, Mai
- **spinosum**, kleiner Strauch mit silberiger, Belaubung und weissen
Blüten im Mai—Juni, 20 cm

Anchusa — Ochsenzunge — Boraginaceae

Buschige dekorative Stauden mit vergissmeinnichtähnlichen Blüten,
im Juni—August

- **italica** „Pride of Dover“, dunkelblau, Pflanze rauhaarig
- — „Dropmore Var.“, grossblumig, dunkelblau
- **myosotidiflora**, Staudenvergissmeinnicht. 40 cm. Mai—Juni
- **sempervirens**

Androsace — Mannsschild — Primulaceae — Schlüsselblumenartige

Eine Gattung der reizendsten und typischsten Alpinen. Sandiger und gut durchlässiger Boden. Mit Ausnahme von *sarmentosa*, *primuloides* und *strigillosa* vor dem Ausbrennen an greller Sonne zu schützen

- **brigiatiaca**, grundständige, kleine Blattrosetten, Blütenstiele bis 10 m, weiss mit gelbem Honigmal, Mai
- **Chamaejasme**, flache, kleine Blattrosetten, kurze Ausläufer treibend, weiss mit gelbem oder rötlichem Schlund, Mai, 6 cm
- **Chumbyi**, silberigzottige kugelige Blattrosetten, Blüten leuchtend violettrosa, 8—10 cm, Mai—Juni
- **helvetica**, Pflanze für Felspalten und Trockenmauern, wo die Wurzeln tief eindringen können, Hartes, halbkugeliges Polster. Die weissen Blüten mit gelbem Schlund sitzen ohne sichtbaren Stiel dem Polster direkt auf, Mai—Juni
- **lactea**, saftiggrünes, kleines Polster, Blüten weiss mit goldgelbem Auge, 4—10 cm, kalkliebend, Juni—August
- **Laggeri**, sattgrüne, nadelige Polster, karminrote Blüten mit gelbem Auge, 8—10 cm, Mai
- **lanuginosa**, silberweisse lockere Rasen bildend, Blüten rosa
- — **Leichtlini**, wie Vorige, Blüten karminrosa mit dunklem Auge, blüht fast durch den ganzen Sommer, 10 cm
- **obtusa**, weissblühend, mit rötlichem Auge, 8 cm.
- **primuloides**, wollseidige Rosetten in lockerem Rasen, Ausläuferrosetten, Blüten karminrosa mit dunklerem Auge, 10 cm, Mai—Juni
- **sarmentosa**, wie Vorige, Blüten etwas kleiner, lilarosa
- **sempervivoides**, kahle, dachziegelartig, angeordnete Rosetten, Blüten, lebhaft rosa, 8 cm, Mai—Juni
- **strigillosa**, Rosetten graugrün, weissfilzig, Blüten karmin
- **villosa**, dichte, kleine, weissseidige Polster, Blüten violettrosa, 6—8 cm, Mai—Juni
- — **pennicillata**, karminrosa, Abart der Vorigen

Anaphalis margaritacea — Compositae —

Winterharte Strohblume, ähnlich einer Immortelle, weiss, 30—40 cm. Juni—August

Anemone — Windröschen, Anemone — Ranunculaceae.

- **alpina**, einheimische Alpenanemone, Kronblätter weiss, auf der Rückseite blau angelaufen, die originellen Samenstände sind im Volksmund als „Alte Mannen“ bekannt. Kalkliebend, 30—40 cm, Mai—Juni
- — **sulphurea**, wie Vorige, jedoch schwefelgelb, kalkfliehend
- **apennina**, Knollenpflanze, ist unserm Buschwindröschen ähnlich, hat jedoch grosse, schieferblaue, sternförmige Blüten, April—Mai
- **apennina alba**, wie Vorige, weisse Blüten
- **blanda**, hellblaue Blütensterne, März
- — **rosea**, hellrosa
- **cilindrica**, cremeweisse Blüten, 30 cm, Juni—Juli
- **fulgens**, scharlachrote, grosse Blumen, 15 cm, April—Mai
- **baldensis**, crème, 20—30 cm, Mai—Juni
- **hupehensis**, gleicht im ganzen Habitus a. *japonica*, Blumen einfach, rotlila, August—September, 70—80 cm

Anemone narcissiflora, weisse, rötlich angelaufene Blütendolden, im Juni, ganze Pflanze behaart, kalkliebend, 30 cm

- **nemorosa fl. pl.**, gefüllte Abart unseres Buschwindröschens
- — **Robinsoniana**, Blumen gross, lilarosa
- **patens lutea**, Küchenschelle mit offenen gelben Blütensternen
- **Pulsatilla**, nickende, violette Küchenschelle, April, 10 cm
- — **alba**, wie Vorige, weiss
- — **amoena**, blauviolett, März—April
- — **rubra**, rotbraune Blumen, die sich aufrecht öffnen, 15 cm
- — — **grandiflora**, rotviolett, grossblumig, April—Mai
- **sylvestris**, rahmweiss, Ausläufer treibend, für halbschattige Lage, April bis Juni, 30 cm
- **vernalis**, Pelzanemonen unserer Berge, Blume nickend, innen bläulichweiss, aussen pelzig behaart, rötlichbraun. März—April

Anemone japonica — Japanisches Windröschchen

Von Anfang September bis zu Frosteintritt nimmt der Blumenflor kein Ende. Die schönsten und besten Herbstblüher liefert uns diese Gattung

- **japonica „Charlotte“**, rosa, doppelreihige Petalkrone, 80 cm
- — **„Coupe d'Argent“**, weiss, einfach, 80—100 cm
- — **„Honorine Jobert“**, weiss, einfach, grossblumig, 80—100 cm
- — **„Loreley“**, lilarosa, halbgefüllt, 60—70 cm
- — **„Montrose“**, rosa, gut gefüllt, nieder, 60 cm
- — **„Prinz Heinrich“**, dunkelrot, gefüllt, nieder, 60 cm
- — **„rubra“**, dunkelrot, einfach, 60—70 cm
- — **„Whirlwind“**, reinweiss, halbgefüllt, 80—100 cm

Antennaria — Katzenpfötchen — **Compositae**

Weissfilzigblättrige, teppichbildende Alpinen mit weissen oder rötlichen Blütenköpfchen, für arme heisse Böden, gute Bordürenpflanze

- **aprica**, Blütenköpfchen gelblich, 15 cm Mai
- **dioeca**, einheimisch
- — **rosea**
- **Neo-dioeca**, kleinblättrig, zierlich, 10 cm
- **parnassifolia**, breitblättrig
- **rubrinervis**

Anthemis — **Compositae**

- **Kelwayi**, gelbe Staudenmargrite, von Juni bis Herbst einen ständigen Flor schenkend, fein zerschnittenes, sattgrünes Laub, 60—80 cm
- — **pallida**, wie Vorige, hellschwefelgelb

Anthericum Liliago — Graslilie — **Liliaceae**.

Grasähnliche Blätter, reinweisse Blütenstände in Rispen, Juni—Juli, 20 cm

Anthyllis montana — Wundklee — **Papilionaceae** — Schmetterlingsblütler.

Niederliegender Zwergstrauch, wollig behaarte Fiederblättchen, weinrote Blütenköpfe, im Juni—Juli, 8—10 cm

- **Jacquini**, Abart unseres einheimischen Wundklee mit braungelben Blüten

Aquilegia — Akelei — Ranunculaceae.

Schnitt- und Schmuckstaude für halbschattige Lage und humosen Boden. Elegante eigenartige Blütenform

- **atroviolacea**, dunkelviolett, 30 cm, Mai—Juni
- **chrysantha**, lange Honigsporne, 40 cm, Mai—Juni
- **coerulea hybrida**. Prachtige Hybriden in reichem Farbenspiel, 40--60 cm, Mai—Juli
- **Helenae**, blau mit weisser Mitte, 40 cm, Juni
- **nigricans fl. pl.**, schwarzviolett, kleinblumig, gefüllt, 25 cm
- **nivea grandiflora**, reinweiss, grossblumig
- **Skinneri**, scharlach mit gelb, 70 cm

Arabis — Gänsekresse — Cruciferae.

- **albida**, reinweiss, kriechend-rasenbildend, April—Mai, 25 cm
- — **fl. pl.**, bekannte, gefüllte Gänsekresse
- **albida rosea**, hellrosa, einfach
- **aubrietoides**, dunkelrosa, grosse Blüten
- **Billardieri**, ähnlich der Vorigen, kleinblumiger, aber dunkler
- **caucasica**, wie albida, Blüten hellschwefelgelb
- **Kellereri**, steinbrechartiges, graugrünes, dichtes Polster, Blüten weiss, 6 cm, Juni—Juli
- **procurrens**, saftiggrüne Blattrosetten, Blätter derb lederig, Ausläufer, Blüten klein reinweiss, April—Mai, 25 cm
- **Sturii**, ähnlich der Vorigen, dunkleres Laub, gedrungener und kompakter

Arenaria — (Siehe auch Alsine) — Caryophyllaceae

- **montana**, lockere Rasen bildend, grossblumig, reinweiss, Mai
- **grandiflora**, grossblumig, weiss, 15 cm, Mai—Juni
- **biflora**, lockerrasig ausgebreitet, sattgrün, weissblühend, 10 cm, Mai bis Juni
- **Ledebouri**, rasenbildend, grasartig-lineale Blätter, zierlicher, weisser Blütenstand, 20 cm, Mai—Juni
- **pungens**, graugrüne, stachelig-starre Polster, verlangt durchlässigen Boden, weiss, 10 cm. Juni
- **purpurascens**, sattgrüne, rasige Polster, Blüten purpurrosa, Mai
- **tetraquetra**, dichte Polster, die Blättchen sind vierkantig um jeden Stiel angeordnet, Blüten weiss, 5—6 cm, Juni
- **Villarsii**, moosartiges Polster von sattgrüner Farbe, Blüten weiss, 8 cm Mai—Juni

Armeria — Grasnelke — Plumbaginaceae.

Immergrüne Polsterpflanzen mit grasähnlichen Blättern, Blüten in Köpfchen auf blattlosem Stiel

- **alpina**, Blütenköpfe hell-dunkelrosa, 20 cm. Juli—August
- **caespitosa**, Dichte Polster bildend, Blätter kurz, nadelförmig, Blü- tenschäfte lebhaft dunkelrosa, 10 cm, Mai
- **formosa**, hell-dunkelrosa, 30—40 cm, 40 cm, Juni—September
- **Lauchiana**, dunkelrot, 15—20 cm. Einfassungen, Mai—Juni
- **maritima**, dichte Polster, graugrün, dunkelrote Blüten, Mai
- — **alba**, weisse Spielart der Vorigen
- **vulgaris**, der ganze Bau ist robust und kräftig, rosa, 30 cm, Mai

Arrhenatherum bulbosum fol. var., weiss panaschiertes Ziergras, 40 cm

Artemisia — Edelraute — Compositae

- **Mutellina**, Alpine silberweissfilzige Edelraute für trockene Lage und durchlässigen Boden, 10 cm, Juni—Juli
- **rupestris**, rasenbildend, graugrüne Belaubung, Juli, 10—15 cm
- **spicata**, feingeschlitztes, silberiges Laub, widerstandsfähiger und weniger anspruchsvoll als erstere, 25 cm, Juni—Juli

Asarum europaeum — Haselwurz — Aristolochiaceae.

Nierenförmige, immergrüne, glänzende Blätter, Bodenbedeckung in schattiger Lage und unter Bäume, 10 cm

Asclepias tuberosa — Seidenpflanze — Asclepiadaceae.

Orangerote Blütendolden im Juni—Juli, Samen springen mit seidigen Flughaaren aus den Kapseln. 50—60 cm

Asperula — Waldmeister — Rubiaceae.

- **helvetica**, Alpine mit weissen Blumen, lockere Rasen, 10 cm
- **hirta**, dichtes Polster mit rosa Blüten, 10 cm, Juni—Juli
- **nitida**, saftiggrünes dichtes Polster, Blüten lebhaft rosa, 8-10 cm, Juli
- **odorata**, einheimischer Waldmeister, weiss, 20 cm, Mai—Juni
- **ciliata**, dunkelrosa, Blätter quirlständig, 25 cm, Juni—Juli
- **longiflora**, hellrosa, feinblättrig lockerrasig, 15 cm, Juni

Aster — Compositae. Wohl selten eine Gattung vermag uns so viele Arten zu geben wie Asten, hoch und nieder, für Frühling, Sommer und Herbst.

- **alpinus**, Alpenaster. Blätter in grundständigen Rosetten. Blüten gross, einzeln, blaulila mit gelber Scheibe, Mai—Juni, 20 cm
- — **albus**, weiss mit gelber Mitte
- — **himalaicus**, zierlicher als Stammform, früher blühend
- — **Nancy Perry**, dunkellila, reichblühend
- — **typica**, dunkelblaulila, Typ unserer Alpen

Aster amellus. Diese Klasse vereinigt eine Reihe hervorragender Spätsommerblüher, Schnitt- und Schmuckstaude

- — **typicus**, niedrige Stammform unserer Alpen, fürs Alpinum
- — „**Beauté Parfaite**“, grossblumig, dunkelviolet, August—Sept.
- — „**Imperator**“ (King Georges), grossblumig, dunkelviolettblau
- — „**Oktoberkind**“, dunkelviolet, Oktober—Frost
- — „**Rubellus**“, dunkellila
- — „**Rudolf Goethe**“, dunkellavendellila, straffe Stiele, grosse Blumen, eine der Besten, 60 cm
- — „**Schöne von Ronsdorf**“, grossblumig, lilarosa
- — **Wienholtzi**, kräftiger Wuchs, rosa, August—September
- **caespitosus purpureus**, mittelgrosse rosa Blüten, nur 30—40 cm, Oktober bis November
- **cordifolius**, „**Blütenregen**“, Rispen feinblütig, zartlila, 70—100, in grossen, eleganten Blütenrispen, September—Oktober
- — **Ideal**, Blütenzweige überhängend, lila, 100 cm
- — „**Hon. Mrs. Edith Gibbs**“, überhängende, verzweigte Blütenstände, lila, September—Oktober, 100 cm

Aster diffusus „Datschi“, zierliche weisse Blütensternchen, im Oktober—November, 70—80 cm

- **ericoides „Sensation“**. Die Masse der kleinen weissen Blüten überzieht die 50—60 cm hohe Staude wie mit einem Schleier

- — **Golden Spray**. Wie Vorige, im Verblühen rötlichgolden
- **Frikartii**, wirklich bahnbrechende Neuheit, reicher und anhaltender Blüher vom August—November
- — **„Wunder von Stäfa“**, himmelblau, 80 cm
- — **„Jungfrau“**, dunkelviolet, 70—80 cm
- — **„Eiger“**, grossblumig lilarosa
- — **„Mönch“**, violettblau, grossblumig
- **ibericus „Ultramarin“**, im Wuchs ähnlich Amellus, indigoblaue Blumen mit gelber Scheibe, 60 cm, August—Oktober
- **Novae Angliae**, diese Klasse umfasst sehr hohe Sorten, deren Blumen in vielblättrigem Hüllkelch sitzen und relativ spät blühen
- — — **„Alpenglühn“**, grossblumig leuchtend karminrot, 150 cm
- — — **„Constance“**, dunkelblauviolett, November, 150—170 cm
- — — **„W. Bowmann“**, blauviolett, Oktober
- — — **„Lil Fardell“**, karminrosa, 150 cm, Oktober

Aster Novi-Belgii, Neubelgien-Aster, unsere Herbststaudenaster in ihrem Sorten- und Farbenreichtum, wovon nachstehend eine Kollektion aufgeführt ist: (Syn. Aster hybrid.)

- **Abendröte**, dunkelrosa, September—Oktober, 100 cm
- **Antwerp**, grosse Rispen, dunkelrosa Blüten, 100 cm, September
- **Archer Hind**, reinblau, mittelgrosse Blumen, 80 cm, Oktober
- **Beauty of Colwall**, hellblaue, halbgefüllte Blumen, 100—120 cm
- **Blue Gem**, leuchtend blau, straffer Wuchs, 120 cm
- **Brightest and Best**, rosa, halbgefüllt, 100 cm, Oktober
- **Ceres**, hellblau, 70 cm, Oktober
- **Climax**, grossblumig, leuchtend blau, eine der Besten, 150 cm
- **Doris**, weiss, 80—100 cm, September—Oktober
- **Eos**, reichblühend, rosa, Anfang September
- **Elta**, lila gefüllt, 100—120 cm, September—Oktober
- **Feltham Blue**, lavendelblau, Stengel und Stiele braunrot, 130 cm
- **Glory of Colwall**, hellblau, gefüllte Blumen, 140 cm
- **Heather Glow**, grossblumig, karminrosa, 120—150 cm
- **Heiderose**, reinfarbig, rosa, prima Schnittsorte, 100 cm
- **King of the Belgians**, lavendelblau, halbgefüllt, 150 cm
- **Lavendel**, hellblau, vollendete Blüten in lockeren Ständen, 120 cm
- **Little Boy Blue**, Kompakt-niederer Wuchs, 60 cm, dunkelblauviolett
- **Loreley**, reinweiss, 100 cm, September—Oktober
- **Mayi**, straff-aufrechter Wuchs, dunkelviolet, 120 cm
- **Peggy Ballard**, lilablau, gefüllt, 80 cm
- **Rachel Ballard**, leuchtend rosa, halb gefüllt, 100 cm
- **Rosalinde**, leuchtend rosa, 100—120 cm
- **Schneelawine**, reinweiss, 80 cm
- **Snowball**, reinweiss, gefüllt, 100 cm
- **St. Egwin**, leuchtend dunkelrosa, gedrunken wachsend, 80 cm
- **S. J. Baker**, blau

Aster subcoeruleus, Folgen in der Blütezeit den Aster alpinus, sehr reich und anhaltend blühend, Mai-Juli, 20—30 cm. Für ganze Gruppen oder Bordüren, ebenso fürs Alpinum

- — **Artemis**, helllila
- — **Apollo**, dunkelblau mit ockergelber Scheibe
- — **floribundus**, lavendelblau, sehr reichblühend
- **Thomsoni**, lavendelblau, ähnlich Aster Amellus, Juli—September, 50—60 cm

Astilbe — Prachtspiere — Saxifragaceae.

Prächtige Schnitt- und Dekorationsstaude in herrlichem Farbenspiel von weiss bis dunkelrot; elegante, vielgestaltige Blütenrispen von 20—120 cm Höhe. Am besten in halbschattiger Lage und feuchtem Boden, in sonniger Lage widerstandsfähig genug, aber nicht so üppig. Juli—August

- **Davidii**, leuchtend purpurrot, langer schmaler Blütenstand. 150 cm, Juli—August
- **hybrida Amethyst**, purpurviolett, 80—100 cm
- — **Avalanche**, lange schneeweisse Blütenrispen, 100—120 cm
- — **Erica**, zierlich braunrote Belaubung, karminrosa, 80 cm
- — **Gloria purpurea**, breite purpurrote Blütenrispen, 60—80 cm
- — **Granat**, dunkelkarminrot, 80 cm
- — **Hyacinth**, reinlila
- — **Irene Rottsieper**, rein lachsrosa, gedungen, 50 cm
- — **Moerheimi**, cremeweiss, extra, 150 cm
- — **Rheinländer**, karminrosa mit lachsfarbener Schattierung
- — **Rubin**, dunkelkarmin-rot, 150 cm
- **japonica alba**, alte aber immer noch geschätzte weisse Sorte
- **simplicifolia alba**, reizende niedere Hybride mit federigen weissen Blütenständen, sehr reichblühend, 20—30 cm. Juli—September
- **simplicifolia rosca**, wie Vorige, leuchtend rosa

Astragalus — Tragant — Papilionaceae — Schmetterlingsblütler.

Niederliegend-aufstrebende Halbsträuchlein mit kopfigen Blütenständen. Lieben durchlässigen Boden und warme Lage

- **alopecuroides**, bis 80 cm hoch, Blüten goldgelb, in wolligen grossen Kugeln in den Blattachseln
- **alpinus**, 8—12 cm, blauviolette Blütenköpfe, Alpinum. Juli
- **depressus**, 8—12 cm, ganz niederliegend, lila, Juli—August

Atamantha rupestris — Augenwurz — Umbelliferae — Schirmblütler.

Zierliche, mehrmals gefiederte Belaubung, Blütendolde weiss, Alpinum. Juni—Juli. 20—30 cm

Astrantia — Sterndolde — Umbelliferae

Interessante Pflanze fürs Alpinum und halbschattige Lage. Der Hüllkelch bildet ein sternartiges Gebilde, das die Blüten, die selber unscheinbar sind, umschliesst wie die Blumenkrone die Staubgefässe.

- **carniolica rosea**, Hüllkelch leuchtend rosa, 60—70 cm
- **major**, einheimisch in unsern Alpenwäldern, hellrosa, 80 cm
- **minor**, zierliche, kleinblumige weisse Form, 30 cm

Aubrietia — Aubrietien, Blaukissen — Cruciferae — Kreuzblütler.

Weit bekannte und allgemein beliebte Polsterpflanze für Alpinum, Trockenmauer und Einfassungen. Von März—Mai verschwinden die grünen Polster unter einer Fülle von violetten Blüten in allen Nuancen. 10 cm

- **deltoidea**, hellblaue Stammform
- — **purpurea**, violettblau
- **hybrida Dr. Mules**, leuchtend dunkelviolett
- — **Lavender**, lavendelblau, grossblumig
- — **Leichtlini Crimson**, leuchtend karminviolett

Aubrietia hybrida Mrs. Lloyd Edwards, dunkel blauviolett

— — **Moerheimi**, grossblumig, rosa

— — **Purpurmantel**, purpur-blau

— — **Purpurteppich**, Rötlichpurpur

— **tauricola**, lavendelblau, geschlossene Polster

— **Eyrüi**, rotviolett

— **graeca**, raschwachsend, blau

Azzorella trifurcata — Azorelle — Umbelliferae.

Dichte niedere Polster bildend, Blattrossetten, einzelne Blättchen dreiteilig, weissliche Blattnerven. 5—10 cm

Asplenium, **Athyrium**, **Aspidium** (siehe Freilandfarne)

Bambusa methake, winterhartes Bambusrohr, geschützte Lage

Bellis perennis — Ausdauerndes Gänseblümchen — Compositae, rot und weiss gefüllt. 10—15 cm

Bellium minutum — Compositae.

Wie kleines Gänseblümchen, dichtgrünes Polster kleiner zierlicher Blättchen, Ausläufer treibend, stammt aus Griechenland und Kleinasien, für Sonne und Halbschatten, blüht den ganzen Sommer, 6-8 cm

— **crassipes**, dickfleischige Blättchen, Juni—September, 6 cm

Berberis (siehe Gehölze), **Bergenia** (siehe Saxifraga), **Blechnum**-Farne

Boltonia latisquama — Compositae

Straffer Wuchs, olivegrüne Blätter, Herbstaster ähnliche Blüten, weiss, in rosa übergehend, 150 cm. September

Bocconia cordata — Federmohn — Papaveraceae.

Blaugrün belaubte Blatt- und Blütenstaude, lockere Rispen rosa-weisser Blüten, 180 cm. Juli—August

Brunella — (Prunella) — Braunelle — Labiatae

Niedere Rasenstaude mit grossen Blütenköpfen von Lippenblüten

— **grandiflora**, dunkelblau, 10—20 cm

— — **incisa**, violettrot, eingeschnittene Blätter

— — **Webbiana**, karminrosa.

Bupleurum — Hasenohr — Umbelliferae

— **baldense**, grasähnliche Belaubung, Grundblätter breit, verzweigte

Dolde braungelber Blüten, 25 cm. Juli—August

— **ranunculoides**, 1—3blütig, 10—15 cm

Bulbocodium (siehe Zwiebelgewächse).

Celamintha alpina rosea — Bergminze — Labiatae.

Zierliche immergrüne Alpine für sonnig-trockene Lage, Blüten einzeln, purpurviolett, 10 cm

Calluna (siehe Gehölze).

Caltha palustris fl. pl. — Dotterblume — Ranunculaceae.

Gefüllte Form unserer einheimischen Sumpfdotterblume

Campanula — Glockenblume — Campanulaceae

— **alliariefolia**, milchweisse, nickende Blumen in langen Aeren, 60—70 cm, leichter Boden, sonnige Lage. Juni—August

— **americana**, herzförmige Grundblätter, blaue schmale Glocke in langen Aeren, 70 cm. Juni—Juli. Halbschatten

- **carpathica**, niedere Art für Alpinum, Trockenmauer und Bordüren, grosse Blumen auf einzelnen Stielen, reinblau, 20—30 cm
- — **alba**, reinweiss, mit blauem Schimmer
- — „**Isabel**“, dunkelblau, Blüten öffnen sich sternförmig
- — „**White Star**“ reinweiss sonst wie Vorige
- **cerphicaria**, dreiteilig eingeschnittene Laubblätter, lichtblaue mittelgrosse Glocken, 30 cm. Juli. Halbschatten
- **fenestrellata**, Glocken tief eingeschnitten, das dichtgrüne Polster ist zur Blütezeit mit blauen Sternchen überdeckt, verlangt etwas Winterschutz, Juni—Juli, 10 cm, Alpinum und Trockenmauer
- **fragilis**, ähnlich der Vorigen, lichtblau, leicht behaart
- **garganica**, reizende Art für Alpinum und Trockenmauer. Blüten tief geschlitzt, wenn voll erblüht sternförmig
- — **hirsuta**, Blattpolster leicht behaart
- — **villosa**, ganze Pflanze wollig behaart, dunkelblau
- **glomerata dahurica**, Blüten aufrecht in dichten Köpfen, dunkelviolet, Juni—August, 40 cm
- — **acaulis**, die Blüten sitzen der Blattrosette fast stengellos auf, Alpinum für halbschattige Lage
- — **superba**, wie die erstbeschriebene, etwas später, Juli—Septemb.
- **grosekii**, grosse hängende rahmweisse Glocken, 40 cm, Juli
- **istriaca**, geht auch unter dem Namen C. Garg, istriaca, dichtpolsterige Alpine, grösseres Laub als garg. dunkelblau.
- **latifolia**, einheimisch, grosse violette Glocken, 60 cm
- — **macrantha**
- **liniifolia**, grasähnliche Blätter, kräftig lichtblaue Glockenblumen, Alpinum, 25 cm, Juni—Juli
- **persicifolia grandiflora**, grossblumig, rein blau, die beste für Schnitt und Rabatte, Sonne und Halbschatten, grundständige Blattrosetten, 80—100 cm. Juni—Juli
- — **alba grandiflora**, weiss
- **Portenschlagiana**. Die beste für Trockenmauer und Alpinum, dicht-rasig, lange Blütenglöckchen, für sonnige Lage, dunkelviolettblau, 10 cm, Juni—Frost
- **pulla**. Einheimische Alpine, 5—8 cm, grossbl., dunkelblau, Halbschatten und Moorboden, nur auf Kalk, Juni—August
- — **pusilla**, Einfassung und Alpinum, 8—10 cm. Ausläufer bildend und dichtrasig, himmelblau. Sonne und Halbschatten
- — **alba**, wie Vorige, weiss
- — **caespitosa**, Stengel mehrblütig, hellblau, bis 20 cm
- — **alpestris**, polsterbildend, nur wenige Ausläufer
- **pyramidalis**, pyramidale Blütenstände, blau, bis 150 cm
- — **alba**, wie Vorige, weiss
- **Raddeana**, rötlichviolette Glocken, verzweigte Blütenstände, Juli—August, Alpine, 20 cm
- **Raineri**. Aus den italienischen Alpen, ähnlich pulla, etwas behaart, dunkelblau, 6—8 cm, Juli—August, Alpinum

- **rotundifolia**, tiefblaue, vielblütige Stände, mittelgrosser Blumen, für trockene Lagen ein williger Blüher, 30 cm, Juni—Juli
- — **superba**, grossbl., robustere Kulturform
- **Aucheri**, grundständige Blattrosette, hellblaue aufrechte grosse Glocken, nur Alpinum in nicht zu sonniger Lage
- **Pipierii**, leuchtend blau, 30 cm, Juni
- **sarmatica**, rauhaarige Blattrosetten, blaue Blütenrispen, Juni—Juli, 30 cm
- **Saxifraga**, kompakte Blattrosetten, rötlich-violette einzelne Blüten, 10—20 cm, Nur fürs Alpinum, Juni
- **Scheuchzeri**, hellblau-grossblumig, die zierliche Glockenblume unserer Alpenweiden, 15—20 cm, Juni—Juli
- **turbinata**, graubehaart, grosse blaue Becherglocken, sonst ähnlich *carpathica*
- — **hirsuta**, weissfilzig behaart
- — **hybrida**
- — **Wilsonii**, ein natürlicher Hybrid zwischen *pulla* und *turbinata*, tiefdunkelblaue, grosse Blüten, 10 cm, Juni—Juli

Cardamine trifoliata, Schaumkraut, — Cruciferae.

Blätter dreiteilig, derb lederig, Blütenstände weiss, für schattige Lage im Alpinum und humosen Boden, April, 10—15 cm.

Carlina acaulis — Silberdistel unserer Berge — Compositae, Juli—August, 10—20 cm

Centaurea — Flockenblume — Compositae

- **nervosa**, dunkellila, 40 cm, Juni—Juli
- **Kotschyana**
- **montana**, dunkelblaue, grossbl. Flockenblume unserer Bergwälder, 30—50 cm, Juli—August
- — **alba**, weiss
- — **rubra**, rotviolett
- **Urvilli**, dickderbe Belaubung, rötlichviolett

Centranthus — Spornblume — Valerianaceae.

Blaugrüne Belaubung, reichblütige feine Blütenstände, im Mai—

August, Sept.—Okt. Besonders für trockene, heisse Lagen. 70—80 cm

- **ruber coccineus**, leuchtend rot
- — **albus**, weiss

Cephalaria alpina — Schuppenkopf — Dipsaceae.

Aehnlich einer *Scabiosa*, verzweigte Blütenstände mit blassgelben Blütenköpfen, 100 cm, Juni—Juli

Cerastium — Hornkraut — Caryophyllaceae.

Für Einfassungen, zur Bekleidung sonniger trockener Böschungen und im Alpinum. Rasenbildende, weissfilzige Alpinen mit weissen Blüten

- **alpinum lanatum**, Spingewebartig überzogene Blattrosetten
- **lanatum**, kleinblättrige schneeweisse Art
- **tomentosum Biebersteini**, grossblumig

Cheiranthus Allioni — zweijähriger Goldlack — Cruciferae.

Für einmalige leuchtende orangefelbe Farbeneffekte

Chelone — Schlangenkopf — Scrophulariaceen.

Mittelhohe bis hohe Schmuckstauden, 80—100 cm, Blütenglöckchen in langen lockeren Rispen

- **barbata**, leuchtendrot, Juli—Oktober
- — **hybrida**, rosa-dunkelrote Farbtöne
- **glabra**
- **Lyonii**

Chrysanthemum — Wucherblume, Winteraster — Compositae

- **indicum**. Die nachfolgend aufgeführten Arten sind winterharte Chrysanthemen, die in unserem Klima gut überwintern. Bei schweren, nassen und kalten Böden ist Winterschutz zu empfehlen. Dankbare Blüher in überaus reichem Farbenspiel, vom September bis Frost

Apricot, aprikosenfarbig-bronce, Oktober

Altgold, altgold-gelb, Oktober

Anastasía, dunkellila Pompon, nieder, eine der Besten, August—September

Baronne de Vinols, lila mit rot und etwas gelb, September—Oktober

Baron de Brailly, strahlenförmige grosse Blüten, hellrosa, Oktober

Batterie, dunkelzinnobler mit gelb, Oktober

Belle Mauve, Silberigmauve, grossbl., mittelhoch, Oktober

Biedermaier, hellrosa, gute Schnittsorte, schöne Herbstfärbung des Laubes, September—Oktober

Border Beauty, niedrig, feurig-orange, September—Oktober

Canary, goldgelb, grossblumig, Oktober

Ceddy Mason, dunkelrot, einfach mit gelben Scheibenblüten, Sept.—Okt.

Champ d'or, nieder, goldgelb, August—Oktober

Champagne, mittelhoch, dunkelkarminrot, September—November

Charles Curtis, einfach, dunkelscharlach mit gelber Mitte, halbhoch, Oktob.

Cinamon, hell-braungelb, mit gelber Mitte, einfach, September—Oktober

Crimson Queen, scharlach mit gelb, nieder, halbgefüllt, September—Oktober

Chouchotte, nieder, pomponblütig, karminrot, September—Oktober

Diana, bronze-orange mit gelb, halbhoch, September—Oktober

Edellila, feinstrahlig, lila, grossblumig, Oktober

Etoile rouge, langstrahlig, weiss gefüllt, grossblumig, Oktober

Fauvette, weinrot, mittelhoch, Oktober

Flora, Gruppensorte, September—November, goldgelb

Gerbe, bronzebraune, kleinblumige Pompon, September—Oktober

Howard H. Crane, mittelhoch, kastanienbraun, Oktober

Hans Schmid, leuchtend karminrot mit gelber Mitte, einfach, Oktober

Herbstrubin, samtig, braunrot, September—Oktober, halbhoch

Hesperus, terracotta, gut gefüllt, Oktober

Herco. Eine der Besten für den Schnitt, Blüten mittelgross, gelborange mit rosa, hoch, September—Oktober.

Jan Viaud Bryand, sehr früh, braunbronze, August—September

Kupferpompon, niedrig, Gruppensorte, September—Oktober

Lachsstrahlen, lachsfarbig, mittelgrosse Blumen, straffe Stiele

La Garonne, salmrot, Oktober

Le Rhin, rotorange, hoch, Oktober—November

Marched Red, dunkelrot, grossblumig

Mme Marie Masse, violettrosa, September—Oktober

Mme G. Barri, gelb mit rot, Pendant zu Baronne de Vinols

Mary Richardson

Mrs. Bailey, weiss mit rosa, mittelhoch, September—Oktober

Mrs. Thomson, kleinblumig, goldgelb, Gruppensorte, Oktober—November

Mormontelle, grosse leuchtend lila Blumen von edler Form, Oktober

Normandie, fleischrosa, September—Oktober

Novembersonne, grossblumig, gelb, Oktober—November

Purpurine, karminrot, kleinblumig, reichblühend, Oktober—November

Perle Chatillonnaise, hellchamois mit rosa, September

Royonante, strahlenförmig, lachsrosa, Oktober

Ralph Curtius, Rosa mit crème, September—Oktober

R. A. Coots, reinweiss, Oktober

Ruby, dunkelrot, kleinblumig, nieder, September—Oktober

Salmon, Profusion, zart salm, mittelhoch, Oktober

Soleil d'Octobre, hellschwefelgelb, prima Schnittsorte, Oktober—November

Source d'or, leuchtend orange, hoch, Oktober—November

Tapis d'or, gelbe niedere Gruppensorte, Oktober

Western King, grossblumig, hoch, gelb mit bronce

W. Dukham,

Chrysanthemum leucanthemum maximum, grossblumige Kulturformen unserer Wiesenmarguerite

— — **Stern von Antwerpen**, riesenblumig, Juli—August

— — **Mme. Terstege**, Blumenblätter leicht zurückgebogen

— — **Sieger**

— — **Breslau**, halb gefüllt

— **uliginosum** (Syn. *Pyrethrum uliginosum*) hohe Staudenmarguerite mit vielblütigem Blütenstand, September—Oktober, 150 cm

Chrysopsis villosa, niedere, reizende Composite mit goldgelben Blüten für Alpinum und Trockenmauer, 20 cm, Juli—August

— — **Rutteri**, graufilzige Belaubung, 10—15 cm

Chionodoxa — siehe Zwiebelgewächse.

Cimicifuga — Silberkerze — Ranunculaceen.

Zusammengesetzte, dekorative Blätter und elegante, silberweisse Blütenkerzen

— **dahurica**, 150—180 cm, August

— **japonica**, 60—80 cm, August—September

— **racemosa**, 150—200 cm, Juli—August.

— **simplex**, schöne, dichte Blütenähren, überneigend, September—Okt.

Clematis integrifolia — Waldrebe — Ranunculaceae.

Staudenartige Waldrebe, die nicht ranken, violette, nickende Blütensterne, Juni—August, 80 cm

— — **Durandi**, grossblumig, dunkelblau, 80—100 cm, Juni—Oktober, Schlingende Clematis, siehe Gehölze.

- Claytonia virginica** — Portulacaceae. Nordamerikanische Knollenpflanze mit halbschattige Lage und humosen Boden, Blüten zierlich, weiss-rosa, 15 cm, April—Mai
- Codonopsis** — Campanulaceae, zierliche, z. T. halbschlingende Glockenblumen für halbschattige Lage
- **clematidea**, hellblaue, nickende Blüten, 60—70 cm, Juli—August
 - **nudiflora**, hellblau, 40 cm, Juli
 - **sylvestris**, blauviolett, 80 cm, Juni—August
 - **Tangsheni**, weissblau, 30—40 cm, Juni—Juli
- Colchicum** (siehe Zwiebelpflanzen).
- Convallaria majalis**, einheimische Maiblume, Liliaceen
- Coreopsis** — Mädchenauge — Compositae.
- Ueberaus reichblühende Schmuck- und Schnittstauden für sonnige bis halbschatt. Lage. Nicht zu nasse u. schwere Böden. Juni—Herbst
- **auriculata grandiflora**, goldgelb mit leichtem orange Ton, 80 cm
 - **lanceolata grandiflora**, langstielige, gelbe Blüten, 70 cm
 - — „**Golden Queen**“, widerstandsfähigste Art, goldgelb, 80 cm
 - **verticillata**, feinzerteilte Belaubung, Blüten mittelgross. Ganze Pflanze stark verzweigt, Blüten goldgelb mit dunkler Mitte.
- Cortusa Matthioli** — 'Glöckel' — Primulaceae.
- Behaarte, grundständige Blätter, Blütenschaft 20 cm hoch, purpurrote Blütenglockchen, schattige Lage im Alpinum, April—Juni
- Coronilla montana** — Kronwicke — Papilionaceae.
- Goldgelber Schmetterlingsblüher für sonnige Lage im Alpinum, Juni
- Corydalis lutea** — Lerchensporn — Fumariaceen. Zierliche Belaubung und goldgelbe Blüten. Am besten an feuchtem, halbschattigen Standort. Gute Mauerpflanze, 25 cm, April—Oktober
- **aurea**
- Cotula pyrethrifolia** (Syn. *Leptinella squarrosa*) Compositae.
- Fiederigbelaubte, dicht rasige Bodenbedeckungspflanze aus Neuseeland, kleine weisse Margueritenblumen, 10 cm, Juni—September
- Cotyledon oppositifolia** — Harte Echeveria — Crassulaceae.
- Sedumähnliche Pflanze mit fleischigen Blättern und gelben, zierlichen Blütenständen. Warme Lage, 20 cm, Mai—Juni, Alpinum
- Crepis aurea** — Goldpipau — Compositae. Mäusekrautartiger Körbchenblütler unserer Alpmatten, goldgelb, 15—20 cm. Juni—September
- Crucianella stylosa** — Rubiaceen. Quirlständige, nadelförmige, rauhaarige Blätter, purpurrosa Blütenköpfe, sonnig-halbschattig, Juni, 20 cm
- Cyclamen** — Alpenveilchen — Primulaceen.
- **europaeum**, winterhartes Alpenveilchen, wohlriechend, karminrosa, Halbschatten, 10 cm, Herbst
 - **neapolitanum**, schön gezeichnete marmorierte Blätter, hellrosa 10 cm
- Cynoglossum amabile** — Hundszunge — Boraginaceen. Vergissmeinnicht-ähnliche Blütenstände, kobaltblau, 50—60 cm, Halbschatten, Juni
- Cypripedium** — Frauenschuh — Orchideen.
- Freilandorchideen für humosen Boden und Halbschatten
- **Calceolus**, einheimischer Frauenschuh, Mai—Juni, 30—40 cm
 - **acaulis**, amerikanische Art, goldgelber Schuh, braune Flügel, 20 cm
 - **pubescens**, ähnlich der Vorigen, 30—40 cm
 - **spectabile**, Blumen weiss-rosa, 30—40 cm
- Crocus**, siehe Zwiebelgewächse. **Cotoneaster**, **Cornus**, siehe Gehölze.
- Cymbalaria**, siehe *Linaria cymbalaria*. **Cystopteris**, siehe Freilandfarne.

Delphinium — Rittersporn — Ranunculaceen.

Bestbekannte Schnitt-, Schmuck- und Rabattenstaude mit edlen grossblumigen Blütenständen, die grosse Auswahl erstklassiger Züchtungen machen diese Gattung so wertvoll, dass sie in keinem Garten fehlen sollte.

- **chinense**, niedere Sorte mit enzianblauer Blume, 60 cm, Juni—Aug.
- **album**. Wie Vorige, weiss
- **nudicaule aurantiacum**, Blüten in weitblütigen Ständen, rot und gelb, 30 cm, Halbschatten, Juni
- **Zalil sulphureum**, schwefelgelb, 60—70 cm, Halbschatten, Juni

Delphinium Belladonna Hybriden, verzweigte Blütenstände, remontier.

Arnold Böcklin, 80 cm, tief enzianblau

Capri, 100 cm, lichtporzellanblau

Grandiflora, 80—90 cm

Andenken an Aug. Koenemann, 150 cm, kobaltblau, mit weisser Mitte

Blue Boy, 100 cm, leuchtend preussisch blau

Lamartine, 80—100 cm, indigoblau, fast den ganzen Sommer blühend, eine der dankbarsten Sorten

Mrs. Brunton, leuchtend himmelblau, edle Blütenform, 100 cm

Moerheimi, weiss, 150 cm

Mrs. Thomson, reines, dunkelblau mit schwarzer Mitte, 100 cm

Schwalbach, nieder, kompakt, hellblau, dichte Blütenstände, 60—80 cm

Theodora, kornblumenblau, grossblumig, lockere Stände, 120 cm

Delphinium elatum Hybriden, lange walzenförmige Blütenstände von ansehnlicher Höhe

Amos Perry, grossbl., halbgefüllt, hellblau-lila, 150 cm Höhe.

Boerhave, mittelgrosse Einzelblüten, dichte reinblaue Stände, 130—150 cm

Cambria, sehr grosse Einzelblüten, vollk. Stände, hellblau, 150 cm

Corry, kornblumenblau, halbgefüllt, 120 cm

C. W. Matthes, reinblau, 180 cm

De Ruyter, grossbl., reinblau, 120—150 cm

Elatum blaulila, sehr starkwüchsig, grossblumig, blaulila 150—180 cm

Firmament, indigoblau mit rötlichen Schattierungen, halbgefüllt, 160 cm

K. Th. Caron, dunkelblau mit hellem Auge, grossblumig, 160 cm

King of Delphiniums, dunkelviolettblau mit weissem Auge, eine der besten 180 cm, starkwüchsig

Ivorine. Vielleicht die beste Weisse, grossblumig, bis zu 50 cm, lange Rispen. Neuheit.

Lorenzo di Medici, reinhimmelblau, gefüllt, rosa Schattierungen

Mevr. Horstman, dunkelblau mit violetten Streifen, 160—180 cm

Miki Ruys, grossblumig, rahmweiss gefüllt, 80—90 cm hoch

Monarch of Wales, sehr grossblumig, Blauviolett mit rosa, 150—180 cm.

Nagels (Franz Nagels), gross, gefüllt, dunkelviolettblau mit weisser Mitte, kompakter Wuchs, 120—150 cm

Novelty, helllila, lockere Blütenstände, 150 cm

Prinz Gustav, äussere Blumenblätter, dunkelviolettblau, innere rein violett, graue Mitte, grossblumig, halbgefüllt

Queen Viktoria, grossblumig und später blühend, mauvefarben, 150 cm

Rozenlust, mittelgrosse Blüten, dunkelblau, dichte Rispen, reichbl.

The Alake, dunkelrötlichviolett, grossbl. bis 2 Meter

Van Veen's Triumph, zartlilarosa, aparte Farbe, 150—180 cm

Wilhelm Storr, blaulila, dichte Blütenstände, 150 cm

Zuster Lugton, dunkelblau, gefüllt, 150 cm

Desmodium — Papilionaceen.

Halbsträuchlein mit kleeartig zusammengesetzten Blättern, zierliche überhängende Blütenstände roter Blüten. Juli—August.

— **Degeni**.

— **Desmodium paniculatum**.

Dianthus — **Nelke** — Caryophyllaceen.

Diese Gattung liefert uns eine grosse Anzahl wertvoller Alpenen für Trockenmauern, Alpinum und Bordüren. Mit wenig Ausnahme schöne immergrüne Polster. Sonnige Lage und eher sandiger durchlässiger Boden.

— **arenarius**, sattgrüne Rasen, duftende zartrosa Blüten, 20—30 cm. Juni—September.

— **atrorubens**, kopfige, dunkelrote Blütenköpfe, 30 cm, Juni—August.

— **barbatus**, bekannte Bartnelke, 30—60 cm, Juni—August

— — **Dunetti**, rosa

— — **nigricans**, schwarzrot

— — „**Scharlachkönigin**“, leuchtend scharlachrot.

— **bicolor**, lockerrasiger Wuchs, hellrot, 15 cm. Juni—Juli.

— **caesius**, leuchtend rosa, eine der besten Felsennelken, Mai.

— **Carthusianorum**. In unsern Alpen heimische Karthäusernelke.

— **deltoides**, dichtfräsig Wuchs, dunkelrote Blüten, im Juni—Sept.

— — **albus**. Wie Vorige, weiss.

— — **Brillant**, feurigrot.

— **gelidus**, graugrüne, schmalblättrige Polster, rosa, Juni—Juli.

— **glacialis**, kleine, fast stachelige Polster, Blüten dunkelrosa, Unterseite gelblich, Juni. 10 cm.

— **giganteus**, kopfige Blütenstände, rot, 30 cm. Juni—Juli.

— **inodorus** (sylvestris), dichte Polster, rot, Juni—Juli.

— **Knappi**.

— **monspessulanus**, olivgrüne Polster, rosa 15 cm. Juli.

— **montanus**, Blüten gross, dunkelrot, Blätter nicht wintergrün.

— **neglectus**, dichte, kleine, steife Polster, rosa mit heller Unterseite, Juni—Juli, 8—10 cm.

— **Pancici**, kopfige, tiefdunkelrote Blütenköpfe, 25 cm, Juni.

— **pinifolius**, lange feine Blätter, Blüten klein, hellrosa, 20 cm.

— **plumarius**, Federnelke (Friesli), in reichem Farbenspiel, Mai.

— — **Alpha**, reinweiss, gut gefüllt.

— — **Delicata**, grossblumig gefüllt, seidiglila.

— — **Ertol**, reinweiss, grossbl., gefüllt.

— — **Saxonia**, dunkelrosa, gefüllt.

— **pungens**, stachelige Polster, weiss gefranste Blüten, 10 cm.

— **Seguieri**, dichte Polster, Blüten leuchtend rosa.

— **subneglectus**, starre Blätter, Blüten rosa, 10 cm.

— **superbus**, Federnelke unserer Hochalpen, duftend, 30—40 cm.

— **zonatus**, Blüten gross mit dunkler Zone in der Mitte, 10 cm.

Dictamnus Fraxinella — Diptam — Rutaceen. Aufrechte aromatische

Stauden, dicke punktierte, gefiederte Blätter, Blüten fleischrot in vollen Rispen, Mai—Juni. 60—80 cm.

— — **alba**. Wie Vorige, weiss.

Dielytra — (Syn. Dicentra, Dicylra) Herzblume — Fumariaceen.

— **Cucullaria**, Knollengewächs aus Nordamerika, rosa, 15 cm.

— **eximea**, farnartige Blätter, hängende, dunkelrosa Blüten, Halbschatten und Schatten, 30 cm. Mai—Juni.

- **formosa**, ähnlich der Vorigen, straffer, Ausläufer, 20 cm.
- **spectabile**, „Frauenherz“, beliebter Frühlingsblüher, lebhaft rosa, hängende Blüten, 60—70 cm. April—Mai.

Digitalis — Fingerhut — Scrophulariaceen, bekannte alte Gartenpflanzen für halbschattige Lagen.

- **ambigua**, hellschwefelgelb, innen mit brauner Zeichnung.
- **ferruginea**, schmalblättrige Blattrosetten, Blütenrispen bis meterhoch, rotbraun. Juni—Juli.
- **lanata**, rahmgelb mit braun, 150 cm. Juli—August.
- **lutea**, immergrüne Blattrosetten, Blüten klein, gelb, 80 cm
- **purpurea**, purpurrot mit schwarzen, weissumranderten Punkten.
- **gloxiniaeflora**, grossblumige Gartenform, Variationen von weiss bis dunkelrot.
- **nevadensis**, gelb, mit brauner Aderung, Juni—Juli.
- **orientalis**.

Dodecatheon Meadia — Primulaceen, zierliche purpurne Blüten mit zurückgeschlagenen Petalen, ähnlich einem Cyclamen, für halbschattige kühle Lagen. Mai. 20 cm.

Doronicum — Gemswurz — Compositen.

Margueritenähnliche grosse Blumen, gelb, prima Schnitt- und Schmuckstaude, Sonne—Halbschatten.

- **Columnae**, grossblumig, 40—50 cm, April—Mai.
- **plantagineum excelsum**, 80—100 cm. April—Mai.
- **plantagineum magnificum**, etwas später als Vorige.

Draba — Hungerblümchen — Cruciferen.

Niedere, reizende Polsterpflanzen, die aus dichten Rosetten gebildet werden, dankbare Frühlingsblüher für Trockenmauer und Alpinum.

- **aizoon**, gelb, starr behaarte Rosetten, 8—10 cm.
- **aizoides**, gelb, 8—10 cm. April—Mai.
- **Bertoloni**, saftiggrüne behaarte Polster, goldgelb, Mai.
- **bruniaefolia**, dichtes, weiches Polster, hellgelb, April.
- **carduuchorum**, weiss, 10—15 cm, Juni—Juli.
- **corsica**, weiss, 3—8 cm.
- **diversifolia**, leuchtend goldgelb, eine der besten, 5—10 cm.
- **heterocoma**, goldgelb, grossblumig, extra.
- **hirta**, weiss, 8—10 cm.
- **lucida**, weiss, 10 cm.
- **nivea**, flache Rosetten, weiss, 8—10 cm.
- **olympica**, ganz dichtpolsterig, feinlaubig, goldgelb, 4—8 cm
- **repens**, Ausläufer treibend, dichtrasig, goldgelb.
- **Sündermanni**, reinweiss, 8—10 cm.

Dracocephalum Ruyschianum — Drachenkopf — Labiaten.

Halbsträuchlein für Felspartie, dunkelblaue Lippenblüten in vielblütigen Ständen, sonnige Lage, 25 cm.

Dryas — Silberwurz — Rosaceen.

- **Drummondii**, nordamerikanische Felsenpflanze, immergrün, nickende gelbe Blüten, 15 cm, Mai.

- **Drummondii x lanata**, wie Vorige, Blätter silberig behaart.
- **lanata**, Blätter silbergrau behaart, Blüten weiss, 15 cm.
- **octopetala**, einheimische Silberwurz, weisse aufrechte Blüten.
- **Sündermanni**, raschwüchsig, crèmeweisse, grosse Blumen.
- **tenella**, kleinblättriger, dichter Rasen, weiss.

Echinops — Kugeldistel — Compositae.

Dekorative Stauden mit kugeligen, blauen stacheligen Blüten.

- **humilis**, stahlblau, 100 cm, Juli—August.
- **Rietro**, hellblau, 100 cm. August.

Epigea repens. Vaccineaceen. Heidelbeerartiges Sträuchlein mit hellrosa Blüten und breiten behaarten Blättern. Nordamerika. Humoser Boden, Halbschatten, Juni. 10 cm.

Epilobium — Weiderich—Weidenröschen — Oenotheraceen.

- **Fleischeri**. Niedere Alpine mit leuchtend roten Blüten, 20 cm.
- **Hektori**, braunblättriger Kriecher aus Neuseeland, rosa, 5 cm

Epimedium — Sockenblume — Berberidaceen.

Halbimmergrüne dekorative Blätter, die besonders im Austrieb prächtige Farbenkontraste hervorbringen, Blüten erinnern an kleine Orchideen, Halbschatten und nicht zu schwerer Boden.

- **alpinum**, purpurrot mit gelb, 30 cm. April—Mai.
- **discolor**, karminrot mit gelben Spitzen.
- **niveum**, reinweiss, 20 cm.
- **pinnatum**, grossblumig, schwefelgelb, 30 cm.
- **rubrum**, karminrot, 25 cm.

Ephedra, Erica, siehe Gehölze. **Eranthis**, siehe Zwiebelgewächse.

Eremurus robustus — Kleopatranadel — Lilienschweif — Liliaceen.

Einzigartige Liliacee mit weissen bis zu 3 Meter hohen Blütenständen. Verpflanzzeit Herbst. Mai—Juni.

Erigeron — Berufungskraut — Compositen.

Zier-, Rabatten und Schnittstauden von Asterähnlichem Habitus.
Zier-, Rabatten- und Schnittstauden von asterähnlichem Habitus.

- **compositus**, Alpine nur fürs Alpinum, hellblaue Blumen, 10 cm
- — **triifidus**, graufilzig behaart, blau mit gelber Scheibe, 10 cm.
- **aurantiacus**, orangerote Blumen, im Juni, 20 cm.
- **hybr. Amos Perry**, grossbl., reichblühend, lila, 40 cm.
- — **Antwerpia**, Blüten bis 5 cm Durchmesser, dunkellila, 60—80 cm, Juli—August.
- — **Asa Gray**, aprikosenfarbig, 30 cm. Juni—August.
- — **Lasur**, azurblau, 50—60 cm. Juni—Juli.
- — **Quackeress**, grossblumig, lilarosa, 50 cm. Juli.
- **mesagrande speciosus**, dunkelblauviolett in schönen Dolden, 50 cm.
- **speciosus grandiflorus**, grossblumig, dunkelblau, 60 cm. Juli

Erinus alpinus — Leberbalsam — Scrupulariaceen,

Dichte, sattgrüne, kleine Polster, die purpurvioletten Blüten in reichen Blütenständen, 10 cm. Mai—Juni.

- — **albus**, reinweiss.

Eriogonum compositum — Wollknöterich — Polygonaceen.

Dichtrasig, Blätter weissfilzig, braun-grün, weissrosa Blütenstände, 25 cm, Juni—Juli. Alpinum.

Eriophyllum lanatum caespitosum — Compositen. Rasig ausgebreitet. Blätter tief gebuchtet, reichblühend, goldgelbe Strahlenblüten im Mai—Juni, 20 cm, Böschungen und Alpinum, Sonne.

Erodium — Reiherschnabel — Geraniaceen.

- **amanum**, feingefiederte Blätter, welche grundständig angeordnet sind und so ein schönes Polster bilden. Alle Arten verlangen trockenen, sonnigen und steinigen Standort, Blüten purpurrosa mit dunkler Aderung. 15 cm. Mai—Juni.
- **guttatum**, blaugrüne Blätter, dunkelrosa, 20 cm. Juni—August.
- **leucanthum**, lange Blätter, rosa, 25 cm. Juli—September.
- **orientale**, dunkelblaugrüne Belaubung, dunkelrosa, 20 cm.
- **trichosantha**, purpurrosa, 15—20 cm. Juli—August.

Eryngium — Edeldistel, Scheindistel, Mannstreu — Umbelliferen.

„Du Hex' mit der Krone aus Amethyst, die eine Distel sein will und doch keine ist“, sagt Kraydolf in seinem Alpenblumenmärchen. Was wir als Blume betrachten ist eigentlich der stachelige Hüllkelch, der sich bei der Vollblüte schön stahlblau färbt. Wertvoll für den Schnitt. Sonniger Standort und durchlässiger Boden.

- **alpinum**, 80—100 cm, tief stahlblau, Juni—Juli.
- **amethystinum**, Blätter tief eingeschnitten, 80 cm.
- **hybr. Juwel**, Juni, 60—80 cm.
- — **Springhill Seedling**, Juli—August, 80—100 cm.
- — **Violetta**, Juli—August, 80 cm.
- **giganteum**, zweijährig, geht nach der Blüte ein. Blätter und Blüten fast elfenbeinfarben, Juli—August.
- **planum coelestinum**, viele kleine Blüten in reichverzweigten Blütenständen, 100 cm. Juli—August.
- **campestre**, niedere Art, von hellblauer Färbung, 40 cm.
- **Oliverianum**. Prächtige amethystfarbene Hybride, 60 cm.

Eulalia — Gramineen. Ziergras von hohem Zierwert.

- **japonica**, bis 2 Meter hoch, imposante Blütenstände.
- — **gracillima**, feinblättrige Form der Vorigen.
- — **zebrina**, Blätter mit gelben Querstreifen.

Euphorbia — Wolfsmilch — Euphorbiaceen.

- **capitulata**, dichtrasig, blaugrüne, zierliche Belaubung, gelbe Blütenköpfchen im Mai—Juni, 5 cm. Alpinum, immergrün.
- **Myrsinthes**, Blätter rings um den niederliegenden Stengel angeordnet, blaugrün. Die gelben Blüten in breiten Dolden, im Mai—Juli. Sonnige Lage. 20 cm, immergrün.
- **polychroma**, dichtbuschige, krautige Staude, gelb, Mai, 40 cm.

Evonymus (siehe Gehölze) **Fritillaria** (siehe Zwiebelgewächse).

Filipendula (siehe Spiraea) **Funkia** (siehe Hosta).

Festuca glauca — Gramineen, dichtrasiges Ziergras mit blaugrauen Blättern für sehr trockene Lage im Alpinum.

Gaillardia — Kokardenblume — Compositen.

Grosse edle Margeritenblumen mit breiten, gezackten Petalen. Wertvolle Schnitt- und Rabattenstauden für sonnige Lage. Fast den ganzen Sommer blühend.

- **grandiflora compacta**, leuchtend gelb mit orange und roten Schattierungen, 40 cm hoch.
- — **maxima**, besonders grossblumig, 50—60 cm.

Galega bicolor Hardtlandtii — Gaisraute — Papilionaceen.

Esparsettenähnliche Staude mit lavendelblau-weissen Blütenrispen über den ganzen Sommer bis tief in den Herbst. Sonne bis Halbschatten, 100 cm.

Galanthus (siehe Zwiebelgewächse).**Galium** — Labkraut — Rubiaceen.

Rasige Alpinen mit quirlständigen lancetl. Blättern und einer Fülle zierlicher Blütensternchen.

- **incanum**, cremeweiss, 20 cm. Juni—August.
- **elatum**, weiss, 25 cm. Juni—Juli.
- **helveticum**, reinweiss, 10 cm, Juni—August, wohl die Beste fürs Alpinum.
- **purpureum**, hellpurpurlila, 15 cm. Juni—Juli.

Gaultheria procumbens — Scheinbeere — Ericaceen.

Immergrünes, niederliegendes Zwergsträuchlein aus Nordamerika. — Hellrosa Blüten, rote Beeren, Schatten-Halbschatten, humoser Boden, 10 cm.

Genista (siehe Gehölze).**Gentiana** — Enzian — Gentianaceen.

Die typischen und best bekannten Vertreter unserer alpinen Flora, nicht zu heisse Lage, frischer lehmiger Sandboden.

1. Gruppe: Eugentiana und Coelanth-Hochstenglige:

- **lutea**, bis 100 cm hohe Blütenschäfte, breite parallelernervige Blätter, tiefgespaltene, fast sternförmige gelbe Blüten. Juli—August.

2. Gruppe: Frigidae und Cruciantae:

Grundständige bis 20 cm lange Blätter, Blüten in kopfigen Blütenständen, Blütezeit Mai—Juli, 15—30 cm.

- **adpressa**, blau.
- **altaica**, lichtblau, im Herbst dekorativ rötlich angelaufene Blätter.
- **asclepiadea**, Schwalbenwurzenzian unserer Bergwälder, tiefblau.
- **alba**, Wie Vorige, weiss, mit grünnlichen Punkten.
- **brevidens**, hellblau.
- **cruciata**, blau einheimisch.
- — **depressa**, raschwüchsig, lange spitze Blätter.
- **dahurica**, tief kobaltblau, nur 10—15 cm.
- **decumbens**, niederliegende Blütenstengel, reichblühend, blau.
- **Fetisowii**, Blütenstengel niederliegend, Blüten weiss mit grün.
- **Freyniana**, tiefblaue Blumen.
- **Gronbezewsky**, rahmweiss mit grünen Schattierungen.
- **macrophylla**, grosse Blattrosetten, bis 40 cm, leuchtend hellblau.
- **mongolica**, lichtblau.
- **phlogifolia**, tiefblau, eine der Besten.

- **Saponaria**, lichtblau.
- **septemfida**, prächtige dunkelblaue, aufrechte Blütenkelche, rasiger Wuchs.
- **straminea**. Beste Weisse, niederliegend, 10 cm.
- **thianschanica**, prächtige leuchtend lichtblaue Art mit edler Blütenform. Aus dem Himalaya, 30 cm.
- **Walujewi**, grossblättrige Art aus Sibirien, hellblau, August.

3. Gruppe: **Tylacites-Glockenblütige:**

- **acaulis**, tiefdunkelblauer Enzian unserer Berge, April, 10 cm
- — **angustifolia**, schmalblättrige Art.
- — **latifolia**, breitblättrige Abart aus den Zentralalpen.
- — **longifolia**, lang und schmalblättrige Abart aus den Westalpen.
- **dinarica**, dichte Rasen, blüht etwas spärlicher.
- **tergestina**, lange kelchartige, grosse Glocken.

4. Gruppe: **Cyclastigma:**

- **bavarica**, bayrischer Enzian, kleine kreisrunde Grundblättchen leuchtend azurblaue Blütensterne, im Juni, 10 cm.
- **verna**. Unser zierlicher sternförmiger Frühlingsenzian, April.

Geranium — Storchschnabel — Geraniaceen.

- **argenteum**, silbrigseidige Blätter, Blüten gross rosa, fürs Alpinum. Juni—August, 10—20 cm.
- **lancastrische**, niederliegend rasig, grosse fleischrosa Blüten vom Juni—Oktober. Alpinum.
- **pratense album**, grossblumig, weiss, Halbschatten, 30 cm.
- **sanguineum**, blauviolett, reichblühend, 40 cm.

Geum — Nelkenwurz, Benediktenkraut — Rosaceen.

- **Borisii**, mennigrot, Juni bis spät in den Herbst, 25 cm. Sonne bis Halbschatten.
- **canadense**, gelb mit braun. 20 cm. Juni—Juli.
- **coccineum fl. pl.** Feuerball, dunkelkarminrot gefüllt, 30—40 cm.
- — **Mrs Bradshaw**, feuerrot gefüllt, blüht den ganzen Sommer.
- — **Lady Stratheden**, dunkelgelb, gefüllt. Pendent zur Vorigen.
- **Heldreichi**, leuchtend orange, einfach. Blüht den ganzen Sommer.
- — **magnificum splendens**. Ueppiges Wachstum, grosse Blüten, in der Farbe etwas heller als die Stammform, 40 cm.
- **montanum**, hellgelbe Alpine, 10—15 cm. Mai—Juni.

Globularia — Kugelblume — Globulariaceen.

- **canescens**, kreisrunde Blättchen und blaue Blütenköpfchen. Nur fürs Alpinum, in halbschattige Lage. 5—8 cm.
- **cordifolia**, rasiger Halbstrauch mit immergrünen zierlichen Blättchen und einer Fülle blauer Blüten im Mai—Juni, 10 cm.
- — **alba**, wie Vorige, weiss.
- — **nana**. Winzige Zwergform der Vorigen, blau, 5 cm.
- **nudicaule**, glänzende grundständige Blätter, blaue Blüten, 20 cm
- **trichosantha**, blau, 20 cm. Juni—Juli.

Gypsophila — Schleierkraut — Caryophyllaceen.

- **cerastioides**, rasenbildend, weisse, rötlich geaderte Blüten, 8—10 cm. Mai—Juni. Alpinum.

- **libanotica**, dichtpolsterig, weisse Blüten, 15 cm. Juni.
- **paniculata**, gew. Schleierkraut, schleierartige, halbkugelige Blütenstände, weiss, Mai—Juni, 60—80 cm.
- — **fl. pl.**, gefüllt blühend. Sehr geschätzt als Schnittblume.
- — **Bristol Fairy**, starkwüchsig, Blüten doppelt so gross wie Vorige, dicht gefüllt. 80 cm. Juli—August.
- **repens**, rasige, blaugrüne Polster, weisser reicher Blütenflor, im Mai bis Juni, 10 cm. Alpinum und Bordüre.
- — **rosea**, rosablütige Abart.
- **Rocejeka**, weiss, 20 cm. Juni.
- **silenoides**, weiss, reichblühend, Alpinum, Juni—Juli, 20 cm.
- **Steveni**, grundständige Blattrosetten, Blüten weiss, Juli, 15 cm.
- **transsylvanica**, feste, tiefgrüne, runde Polster, reinweiss, Juni, 15 cm.

Gymnadenia conopsea — Orchideen, hellrote Freilandorchidee, 15 cm, Juli

Haecquetia Epipactis — Schaftdolde — Umbellifere.

Gelbgrüne Blütenköpfe in blumenartigem, grünen Hüllkelch, 10—15 cm, zierlicher Frühlingsblüher für halbschattige Lage im Alpinum. Humoser Boden, rasenbildend.

Hedera und Hedysarum, siehe Gehölze. **Harpalum**, siehe Helianthus.

Helenium — Sonnenbraut — Compositen.

Wertvolle Spätsommer- und Herbstblüher, die wir in unserem Garten kaum mehr missen könnten.

- **autumnale**, bis 180 cm hohe Herbstblüher mit überreicher Blumenfülle, vom September—Oktober, reingelb.
- — **Gartensonne**, dunkelgelb mit dunkelbrauner Scheibe.
- — **Riverton Beauty**, braunrot mit gelb und Goldschimmer.
- — **Riverton Gem**, Altgoldfarbe.
- — **superbum**, reingelb mit gelber Scheibe.
- **Bigelowii**, goldgelb mit schwarzer Mitte, 60—70 cm, Juni—Juli.
- **hybridum Crimson Beauty**, kupferscharlach, 60—70 cm, Juni—Aug.
- — **Julisonne**, reingelb mit leichter brauner Tönung, Juli—August. Gute Schnittblume, 60—70 cm.
- — **nanum coccineo-bruneum**, dunkelscharlachbraun, 60—70 cm.
- — **Wyndley**, grosse Blütenstände grosser Blumen, goldgelb mit roten Schattierungen, 80—90 cm. August—September.
- **pumilum magnificum**, 60—70 cm. Rein goldgelb, Juni—August.
- — **praecox**, altgold mit braunrot, 70 cm. Juli—September.

Helianthemum — Sonnenröschen — Cistaceen.

Immergrüne Zwergsträuchlein. Für Alpinum, Trockenmauer und Einfassungen, reicher Blütenflor über den ganzen Sommer.

- **alpestre**, niederliegend rasig, hellschwefelgelb, 8—10 cm.
- **canescens argenteum**, hellgelb, ganze Pflanze silbriggrau behaart.
- **Chamaecistus**, rosa-rote Farbentöne, 25—30 cm.
- **mutabile fl. pl. carminatum**, karminrot gefüllt.
- — — **coccineum**, scharlachrot gefüllt.
- **numularium**, ganz niederliegend, gelb, nur fürs Alpinum.
- **pilosum**, schmalblättrig, behaart, dunkelrote Blüten.
- **polifolium**, weiss einfach.
- **serpyllifolium**, niederliegend-rasig, hellgelb, 8—10 cm.
- **vivrescens**, graugrüne Belaubung, zierliche Art, gelb.

Helianthus — Sonnenblume — Compositen.

- **multiflorus fl. pl.**, robuste hohe Staude, ganze Pflanze rauhaarig, Blumen goldgelb gefüllt, 150 cm. August—Oktober.
- — **maximus**, grosse, einfache, edle, goldgelbe Blumen, 200 cm.
- **rigidus**, Ausläufer treibend, zum Verwildern zwischen Gehölzgruppen und an Böschungen. 150—200 cm. Juli—September.
- — **Miss Melish**, grosse edelgeformte Blüten, gelb.

Heliopsis — Sonnenauge — Compositen.

- **scabra imbricata**, erinnert im Wuchs an kleine niedere Sonnenblume, gute Schnittstaude, goldgelb gefüllt, 80 cm.
- — **ziniaeflora**, grosse, leuchtend goldgelbe, gefüllte Blume.

Helleborus — Christrose — Ranunculaceen.

- **orientalis hybridus**, rosa-rote Farbtöne, halbbimmergrüne, grosse dekorative Blätter, Halbschatten, 30—40 cm. Mai—Juni.
- **niger grandiflorus**, reinweisse grosse Blumen, Dezember-Februar.
- — **altifolius**, grossblumig, weiss mit rosa.
- **corsicus**, feingesägte, saftiggrüne Blätter, Blüten nickend, grünlich-weiss, Februar—April, 40 cm.

Hemerocallis — Tagililie — Liliaceen.

- **aurantiaca**, lilienartige, grosse Becherblüten, orangerot, Sonne-Halbschatten, Juni—August, 80 cm.
- „**Apricot**“, aprikosenfarbig, 60 cm.
- **Middendorffiana**, nieder, kompakte Art mit kupferorange Blumen.

Hepatica triloba — Leberblümchen — Ranunculaceen.

Einheimisch, blau, herrlicher Frühlingsblüher als Unterpflanzung oder für schattige—halbschattige Lage, 10 cm.

- — **rubra**, rotviolett, einfach.
- — — **fl. pl.** rotviolett, gefüllt.
- — **alba**, weiss, einfach.

Herniaria — Bruchkraut — Cariophyllaceen.

Gute Bodenbedeckungspflanze, selbst für arme und trockene Böden.

- **glabra**, dichte, saftiggrüne Rasen, Blüten unscheinbar, grünlich.
- **pyrenaica**, graugrüne Polster, Blüten grünlich. in durchsichtigem, papierartigem Hüllkelch eingeschlossen.
- **villosa**, graufilzig behaart.

Heuchera — Purpurglöckchen — Saxifragaceen.

- **sanguinea „Pluie de feu“**, zierliche purpurrote Blütenglöckchen an dünnem elegantem Stengel, kreisrunde, grundständige Blätter. Als Rabattenstaude, fürs Alpinum oder Einfassung. 40 cm. Mai—Juli.
- — **splendens**. Scharlachrot.

Hieracium aurantiacum — Habichtskraut mit purpurbraunroten Blütenköpfen, sonn. Lage, anspruchslos punkto Boden, Compositen, 30 cm, Juli—Oktober.**Homogyne alpina** — Hasenlattich — Compositen, Schattenpflanze fürs Alpinum, braunrote Blütenköpfchen, 10—20 cm. Humoser Boden.

Horminum pyrenaicum-Labiaten. Salbeiähnlicher Lippenblütler, kompakte Rosetten, Blüten blau, Mai—Juni, 20 cm.

Hosta-(Funkia), Funkie — Liliaceen.

Dekorative Blattpflanzen für halbschattige Lage. Feuchter, tiefgründiger Boden.

- **coerulea aureo-marginata**, Blätter dunkelgrün, gelb panaschiert, bis 30 cm, hohe weisse Blütenschäfte, Mai—Juni.
- **lanceolata**, schmalblättrige zierliche Art.
- **Sieboldiana**, robust, graugrün- Belaubung, Blüten lila.
- **cordata**, grün, lilaweiße Blüten.

Houdsonia ericoides — Ericaceen, gelbblühendes Halbsträuchlein aus Nordamerika, sandiger, durchlässiger Boden, nur für geschützte Lage und mit etwelchem Winterschutz, 25 cm.

Houstonia coerulea — Rubiaceen. Nordamerikanische Polsterpflanze mit einer Menge weissblauer Blütensterne bedeckt, April—Mai, halbschattige Lage im Alpinum, 10 cm.

- **serpyllifolia**, rasenartig sich ausbreitend, hellblau, sonst wie Vorige.

Hutschinsia alpina — Genskrese — Cruciferen.

Zierliche Alpine mit unpaarig gefiederten Blättchen und kleinen weissen Blütendolden, feuchte Lage im Alpinum, Mai—Juni, 10 cm.

- **Auerswaldii**, etwas robuster im Wuchs als Vorige. 10—12 cm.

Hypocrepis comosa — Hufeisenklee — Papilionaceen.

Zierliches, niederliegendes Zwergsträuchlein mit goldgelben Blumen. Sonlig, Alpinum und Trockenmauer, Mai—Juni, 10 cm.

Hypericum — Johanniskraut — Hypericaceen.

- **calycinum**, breitblättrige robuste Art mit grossen goldgelben Blumen. Zur Massenanpflanzung ganzer Böschungen u. Einfassungen, Sonne—Halbschatten, 20—30 cm. Mai—Juli.
- **Androsaemum**, breitblättrig, gelb, Frucht in engständiger, schwarzer Scheinbeere, 30 cm. Juni—Juli.
- **Coris**, zierliche, gelbe Blütensterne, erikaähnliches Sträuchlein für sonnige, geschützte Lage. 20 cm. Juni—Juli.
- **Degenii**, silberfilzig behaarte Belaubung, gelbe Blüten, 30 cm.
- **fragile**, niederliegend, rasenbildend, eine Menge goldgelber Blüten im Mai—Juli. 15—20 cm.
- **Kotschyii**, zierliche, saftiggrüne Polster, gelbe Blumen, 15 cm.
- — **nana**, Zwergform der Vorigen.
- **Mooserianum**, aufrechter, zierlicher Zwergstrauch von hohem Wert, Blumen gross, goldgelb mit weitvorstehenden, rötlichen Staubgefässen, 30—40 cm, Juni—August, Sonne bis Halbschatten.
- **patulum**, ähnlich der Vorigen, schmalere Blätter, kleinere, dafür zahlreichere Blüten, 80—100 cm.
- — **Henryi**, sehr reichblühende Form.
- — **grandiflorum**, grossblumig.
- — **magnificum**, üppiges Wachstum.
- **polyphyllum**, dichtrasig, niederliegend, Blumen einzeln, gross, gelb, 15—20 cm. Mai—Juni.

- Hyssopus officinalis** — 25 cm hoher Halbstrauch mit blauvioletten Lippenblüten, sonnige Lage im Alpinum. Juni—Juli.
 — **albus**, weissblühende Abart.
- Iberis** — Schleifenblume — Cruciferen.
 Es sind dies immergrüne Halbsträuchlein, mit schmal lanzettl. derben Blättchen, grosse buschige Polster bildend, vom April—Juni bedeckt mit einer Fülle weisser Blütenköpfe, sonnige Lage, Alpinum, Trockenmauer und Bordüren.
 — **Pruitti**, lockerer Busch, Blüten weiss mit violetter Tönung.
 — **Lagascana**, dichtpolsteriger Wuchs, weiss, 25 cm. Mai.
 — **sempervirens**, schneeweiss, 30 cm. Mai—Juni.
 — — „**Little Gem**“, zierl. Form von kugeligem Wuchs, weiss, 15 cm
 — — „**Snow Flake**“, grossblumig, schneeweiss, 25 cm, eine der Besten
 — — „**Weisser Zwerg**“, grossblumig, reinweiss, gedrunken
 — **nana**, zierliche Zwergform für Alpinum.
- Ilex, Juniperus**, siehe Gehölze.
- Incarvillea** — Freilandgloxinie — Bignoniaceen.
 — **Delaway**, grosse glockenförmige Blumen auf 70—100 cm hohen Stielen, prächtige Rabatten- und Gruppenstaude, durchlässiger Boden, Sonne—Halbschatten, Mai—Juni.
 — **grandiflora brevipes**, grossblumig, purpurrosa, 50 cm.
- Inula** — Alant — Compositen.
 — **ensifolia**, kompakter, geschlossener Wuchs, schmallanzettl. Blätter, goldgelbe Blumen in reicher Fülle, 25 cm. Juni—Juli.
 — **glandulosa grandiflora**, üppiger Wuchs, breite behaarte Blätter, grosse, orangegelbe Blumen mit feinen Petalen, 40—60 cm. Halbschattige Lage. Mai—Juni.
 — **graveolens**, aufrechte Staude für Halbschatten, gelb, 120 cm.
- Iris** — Schwertlilie — Iridaceen.
 — **arenaria**, niedere Art mit goldgelben, braun gezeichneten Blüten. — Nur für Alpinum, in sonniger, geschützter Lage, 10 cm.
 — **cristata**, hell bis dunkelblau, grossblumig, 15 cm. Mai—Juni. Alpinum, durchlässiger Boden.
 — **fulva**, grasähnliche, schmale Blätter, helllila, Winterschutz, 30 cm.
- Iris germanica**. Diese Gattung umfasst uns Gartenschwertlilien in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit, mit andern Sorten gekreuzt, ist ein reiches Farbenspiel entstanden. Anspruchslos punkto Bodenverhältnisse und Pflege. Beste Zeit des Verpflanzens zeitig im Frühjahr oder nach der Blüte. 50—100 cm. Mai—Juni.
- Anny Gray**, zartrosa.
- Archeveque**, violett und samtpurpur.
- Canary Bird**, hellgelb.
- Corrida**, Domblätter zartlila, Hängeblätter, dunkellila.
- Florentina alba**, crèmeweiss mit zarter lila Aderung.
- G. Balder**, Dom gelb-olivefarbig, Hängeblätter pflaumenblau, olive gerandet.
- Innocenza**, reinweiss.

Iriskönig, grossblumig, goldgelbe Domblätter, Hängebl. samtbraun.

Karputh, hell- und dunkelpurpurviolett.

Mme. Chereau, weiss mit lila.

Loreley, Dom blassgelb, Hängebl. dunkelultramarinblau mit gelbem Rand.

Khediye hell- und dunkellila.

Macrantha, grossblumig, dunkelviolet.

Mithras, gelber Dom, Hängebl. zart weinrot mit gelbem Rand.

Mrs. H. Darwin, weiss, purpurrot geadert.

Mrs. Reuthe, reinweiss mit lila.

Nibelungen, Dom olivefarbig mit gelb, Hängebl. purpurviolett mit gelb.

Prosper Laughier, purpurviolett.

Prinzessin Vikt. Louise, schwefelgelb mit purpur.

Iris gracilipes, zierliche grasähnliche Belaubung, helllila Blüten in mehrblütigen Blütenständen, 15—20 cm. Mai—Juni.

— **hexagona**, empfindlichere Art aus dem amerikanischen Mittelwesten, blau mit gelb, 35 cm, Winterschutz, Alpinum.

— **interregna**, erinnert im ganzen Wuchs an *germanica*, blüht aber ca. 14 Tage früher. Verwendung wie *germanica*.

— — **Frijtjoff**, Dom lavendelblau, Hängebl. samtig violett.

— — **Helge**, zitronengelb mit elfenbeinweiss.

— — **Ingeborg**, reinweiss.

— — **Walhalla**, lavendelblau mit weinrot.

— **graminea**, hellviolett, dunkler geadert, Blätter grasähnlich, länger als die Blütenstiele, Aprikosenduft, 40—60 cm.

— **lacustris**, niedere Art für Felspartie, dunkelblau, 15 cm, Mai.

— **Monspur**, edle, grosse, reinhellblaue Blume, 60—80 cm. Mai—Juni.

— **pallida dalmatica**, kräftiger Wuchs, starke straffe Blütenstengel mit reinblauen Blüten, prima Schnittblume.

— **pseudacorus**, Unsere gelbe Wasserschwertlilie, feuchter Standort

— **pumila**, zierliche, niedere Schwertlilie für Bordüre und Alpinum, Behandlung wie *germanica*, 15—30 cm, April—Mai.

— — **alba**, weiss.

— — **cyanea**, hellblau.

— — **formosa**, dunkelpurpurviolett.

— — **lutea**, hellschwefelgelb.

— **reticulata**, Zwiebelgewächs, wunderbare dunkelpurpurviolette, grosse Blüten, sofort nach der Schneeschmelze, 10 cm.

— **sanguinea**, ähnlich der bekannten nachfolgenden Art, Blüten dunkelviolettblau, gleich hoch wie die Blätter.

— **sibirica**, Blätter weich, lineal, Blüten mittelgross, blau mit dunkler Aderung, feuchter Standort, prima Schnittblume, 80 cm.

— — „**Emperor**“, grossblumig, dunkelpurpurviolett.

— — „**Perry's Blue**“, hell- und dunkelblau.

— — „**Snow Queen**“, reinweiss.

— **Tenax**, steife grasähnliche Belaubung, empfindlichere Art aus dem amerikanischen Mittelwesten. Winterschutz.

Kniphofia — siehe *Tritoma*.

Koeleria glauca — Blaugras — Gramineen, feines, niederes Ziergras von Blaugrüner Färbung, für trockene Lage im Alpinum, 10 cm.

Lavandula — Lavendel — Labiaten.

- **vera**, gewöhnlicher Lavendel mit blauen Blütenrispen, sonnige durchlässige Lage, Alpinum und Bordüren. Juni
- **spica Middachten Var.**, gedrungene, reichblühende wohlriechende Art
- **Munstead Var.**, dunkle Blüten.
- **multifida**, fiederig eingeschnittene Laubblätter.

Leontopodium — Edelweiss — Compositen.

Sonnige Lage, nicht zu schwerer Boden, dem am besten etwas Bau-schutt beigefügt wird, um das Grünwerden der Pflanze zu verhind.

- **alpinum**. Edelweiss unserer Alpen. Juli.
- **sibiricum**, grossblumig und widerstandsfähig.
- **macrocephalum**, sehr grossblühende Art aus dem Himalaya.

Leiophyllum, Ligustrum, Lonicera, siehe Gehölze.**Lewisia rediviva** — Portulacaceen, weissblühende grossblumige Vertreterin aus den Rocky Mountains Nordamerikas. Nur für geschützte trockene Lage, 10 cm. Mai—Juni.**Liatris** — Prachtscharte — Compositen.

Kerzenartige Blütenstände von eigenartigem dekorativen Wert. Kühle Lage, 60—70 cm. Mai—Juli.

- **callilepsis**, leuchtend purpurrosa.
- **graminifolia**, rot, 120 cm.
- **spicata**, dunkelrot.

Lilium, siehe Zwiebelgewächse.**Lindelia ancusoides**, rauhaarige Borraginacee mit blauen vergissmeinnicht-ähnlichen Blüten, 40 cm. Juni—Juli, geschützte Lage, durchlässiger Boden.**Linaria** — Leinkraut — Scrophulariaceen.

- **alpina** — Alpenleinkraut, niederliegend-verzweigt, fleischige blaugrüne Blätter, blaue Helmb Blüten mit ockergelbem Gaumen.
- **aequitriloba**, kriechend und Ausläufer treibend, zierliche, runde Blättchen und eine Menge kleiner, blauer Blüten mit gelbem Gaumen, zur Bekleidung von Mauern, Steinen etc., da flachwurzeln, nicht zu heiss pflanzen, 3—5 cm. Mai—Oktober.
- **cymbalaria globosa**, kompakt, kugelpolsteriger Wuchs, hellblau.
- **hepaticaeifolium**, ähnlich aequitriloba, Blättchen in Spitzen ausgezogen, hell marmoriert.
- **pallida**, veichenartige, kleine runde Blätter, hellblaue Blüten mit schwefelgelbem Gaumen, eine der Besten, 10 cm.
- **pilosa**, ganze Pflanze leicht behaart, ähnlich der Vorigen, Wucher- und Bodenbedeckungspflanze, 10 cm.

Linum — Lein — Linaceen.

- **alpinum**, niederliegend, aufstrebend, Stengel mit nadelförmigen, blaugrünen Blättern bekleidet, blaue Blüten, 20 cm. Mai—September.
- **austriacum**, ähnlich der Vorigen, höher, dunkelblau, 40 cm.
- **capitatum**, Blätter breit in zierl. Rosetten angeordnet, blau, 15 cm.
- **flavum**, goldgelb, 30 cm, Juni—August, eine der Besten.
- **perenne**, ähnlich austriacum, jedoch Blüten weisslich-blau, 60 cm.

Lithospermum — Steinsame — Boraginaceen.

- **prostratum** „**Heavenly Blue**“, niederliegend verzweigtes Halbsträuchlein, steifhaarig bekleidet, tief dunkelblaue Blüten, sonnige Lage und durchlässiger Boden, Alpinum, 10—20 cm.
- **officinale**.

Lobelia — Lobelie — Lobeliaceen.

- **cardinalis**, aus Nordamerika eingeführte bis 80 cm hohe Staude mit braungrünem Laub und brennend cardinalroten Helmb Blüten in reichblütigen Ständen, für halbschattige Lage und feuchten Standort, humoser Boden, Herbst.
- **inflata**.
- **syphilitica**, blaue Blütenstände, 30—40 cm. August—Oktober, Verwendung wie Erste.

Loisileuria procumbens (Syn. *Azalea proc.*) Ericaceen.

Niederliegendes, dichtes, immergrünes Sträuchlein mit purpurrosa Blütensternchen, 2—5 cm.

Lotus corniculatus versicolor. Hornklee-Papilionaceen.

Niederliegend-aufstrebender Halbstrauch mit goldgelben Schmetterlingsblüten, die sich hernach orange verfärben. Sonnige, trockene Lage im Alpinum, 15 cm. Juni—August.

Lupinus — Wolfsbohne — Papilionaceen.

Fingerförmig geteilte Blätter, die besonders beim Austrieb mit einer Tauperle in der Mitte von ganz eigenartigem Reiz sind, grosse farbenprächtige Blütenähren in reichem Farbenspiel, tiefgründiger Boden. Sonne-Halbschatten.

- **arboreus**, baumartige Wolfsbohne, Triebe verholzend, Blüten in seitlichen Ähren, hellgelb, 100—150 cm, Mai—Juli.
- **Schneekönigin**, reinweiss.
- **Sunshine**, prächtige, grossblumige Neuzüchtung von intensiver, schwefelgelber Farbe.
- **polyphyllus**, die gewöhnliche Staudenwolfsbohne in blauen bis weissen Blüten, 80—100 cm. Juni—August.
- — **albus**, grossblumig, reinweiss.
- — **roseus**, leuchtend rosa.
- — „**Ada**“, kompakter, halbhoher Wuchs, gelb mit orange.
- — „**Chocolate Soldier**“, braunrot mit gelb, widerstandsfähige Sorte, die bis spät in den Herbst remontiert.
- — **C. M. Prichard**, dunkelpurpurrosa mit dunklerem Schiff.
- — **Downers Pink Pearl**, prächtiges dunkelrosa.
- — **Moerheimi**, niedriger Wuchs, reinrosa.
- — **Ruby King**, leuchtendes Purpurviolett.
- — **True Blue**, dunkelblau mit helleren Schattierungen.

Lychnis — Lichtnelke — Caryophyllaceen.

- **alpina**, kleine, dunkelrosa Blütenköpfchen auf kleinem, dichtem Polster, Alpinum, 10 cm, April—Mai.
- **Arkwrhigti**, grossblumige Hybride, orange-rot, 20—30 cm.
- **chalcadonica**, „**Brennende Liebe**“, scharlachrote Blütenköpfe auf 100 cm hohen Stielen, Juni—Juli.
- **Haageana**, grossblumig, hell-dunkelrot, 30—40 cm. Juni—Juli.
- **viscaria splendens**, einfache, karminrote Pechnelke, Mai—Juni.
- — **fl. pl.**, gefüllt blühend.

- Lycopodium alpinum** — Bärlapp — Lycopodiaceen. Moosartige blütenlose Sporenpflanze für halbschattige Lage im Alpinum, 10 cm.
- Lysimachia nemorum** — Weidenkraut — Primulaceen.
Ausgezeichnete Bodenbedeckungspflanze, kreisrunde Blätter, goldgelbe Blumen. Als Unterpflanzung in Gehölzgruppen, Sonne-Halbschatten, auch in steinigen Böden. 10 cm. Juni.
— **punctata**, schwarzpunktierte Blätter, gelbe Blüten, welche rispig angeordnet sind. 60—80 cm. August—September.
- Malva moschata** — Malva — Malvaceen.
40—60 cm hohe Staude mit handförmig geteilten Blättern, hellrosa duftende Blüten in den Blattachseln, Juni—September.
- Magesea**, siehe Saxifraga. **Medicago**, siehe Gehölze.
- Montbretia**, **Muscari**, **Narcissus**, siehe Zwiebelgewächse.
- Mazus Pumilio** — Scrophulariaceen. Niederliegender, blaublühender Helmbütler, Alpinum und zwischen Wegblättern, 5 cm.
— **rugosus**.
- Meconopsis scabra** — Scheinmohn — Papaveraceen.
Blaugrüne, rauhaarige, gezähnte Belaubung, orangerote, nickende Blüten, 20—30 cm, sonnig, durchl. Boden, Juni—Juli.
- Mentha Piperita** — Pfefferminze — Labiaten.
Bekannte echte Pfefferminze, Halbschatten.
- Merthensia virginica** — Borraginaceen.
Knollige Wurzel, blaugrüne, breite Blätter, zierliche kobaltblaue Blüten in eleganten Ständen. Halbschatten, April—Juni.
- Meum Mutellina** — Umbelliferen, fenchelartig zerschnittene Blätter, weiss-rosa Blütendolden, steinige sonnige Lage, 20—30 cm, Mai—Juni, Alpinum.
- Michauxia campanuloides** — Campanulaceen.
100—150 cm hohe Blütenstiele mit weissen Glockenblüten, Blätter in Rosetten, Halbschatten. Juli—September.
- Micromeria** — Felsenminze — Labiaten.
Es sind dies aromatische Zwergsträuchlein mit zierlicher Belaubung und kleinen Lippenblüten, sonnige, trockene Lage und durchlässige Boden. Nur fürs Alpinum.
— **dalmatica**, helllila, 30 cm.
— **nitracata**, lilarosa, 15 cm.
— **Piperella**, leuchtend rosa, zierliche kreisrunde Blättchen rund um um den Stengel, 15 cm.
— **prostrata**, niederliegend, rahmweiss mit rosa Ton.
— **pygmaea**, gedrungen, dicht wachsend, purpurrosa, 15—20 cm.
— **illyrica**, kleine immergrüne Polster, blauviolett, eine der Besten, bis spät in den Herbst blühend.
— **rupestris** dunkellila, 20—25 cm.
- Mimulus** — Gauklerblume — Scrophulariacee.
Rasenbildend für feuchte, halbschattige Lage, grosse Becherblumen vom Juni—Oktober 15—25 cm.
— **luteus**, reingelb mit brauner Zeichnung.
— **tigrinus**, braun und gelb gezeichnet.
— **cupreus**, braunrot mit gelber Zeichnung und braunen und gelben Punkten.

Monarda — Goldmelisse — Labiaten.

Blüten in endständigen quirligen Blütenköpfen, ganze Pflanze stark aromatisch, Juli—September.

- **didyma** „**Cambridge Scarlet**“, 150 cm, scharlachrot.
- **Kalmiana**, blauviolett, 100—120 cm.

Mühlenbeckia — Polygonaceen.

- **axillaris**, immergrüner, teppichbildender Halbstrauch, kleine runde Blättchen von braungrüner Farbe, Alpinum.
- **nana**, in allen Teilen zierlicher als Vorige.

Myosotis palustris, Sumpfvergissmeinnicht — Borragineen.

- **rupestris**, Felsenvergissmeinnicht, gut perennierend.

Nepeta Mussini — Katzenminze — Labiaten.

Aromatische, kräftig wachsende niedere Staude mit blauen Blütenrispen, die in ihrer Gesamtheit wie ein blauer Schleier wirken. Ausgezeichnet zur Bepflanzung von Böschungen. Juli—September, 20—30 cm.

- **Cataria**, aufrechter Wuchs, Blüten weisslichblau, 30 cm.

Nierenbergia rivularis — Weissbecher — Solanaceen.

Rasenbildend, rahmweisse Blüten, die an die der Winde erinnern, Juni—September, Etwas Winterschutz, 10 cm.

Oenothera — Nachtkerze — Onagraceen.

- **fruticosa**, Blumen auf 30 cm hohen Stengeln, leuchtend gelb, Juni—Juli.
- **Fraserii**, Blätter rötlichgrün, besonders im Austrieb, Blüten gross, goldgelb, 40 cm. Juni—September.
- **glabra**, ganze Pflanze klebrig-haarig.
- **glauca**, Blätter blaugrün, Blüten gross, goldgelb, 40 cm.
- **pumila**, kleine zierliche Form fürs Alpinum, Blätter in Rosetten, blaugrün, rötlich angelaufen, Blüten, goldgelb, 5—10 cm. Sonne—Halbschatten, Juni—August.
- **missouriensis**, niederliegend, immergrün, sehr grosse schwefelgelbe Blumen, Juni—September. Sonnig und trocken.
- **rosea**, Blüten klein, dunkelrosa in grosser Zahl, 50 cm.
- **tetraptera**, ähnlich Missouriensis, Blätter tief eingeschnitten, Blüten weiss mit purpurner Aderung.

Olearia, siehe Gehölze.**Omphalodes** — Frühlingsvergissmeinnicht — Borraginaceen.

- **cappadocica**, niedere Frühlingsstaude für halbschattige—schattige Lage, humoser Boden, Blüten vergissmeinnichtähnlich, gross, leuchtend indigoblau, 20—30 cm. April—Mai.
- **verna**, reichblühend, aber kleinbl. als Vorige, hellblau.
- — **alba**. Weisse Abart.
- **linifolia**, ganze Pflanze silberig, weisshaarig, aufrechter Wuchs, Blüten gross, einzeln, zart porzellanblau, 15 cm.

Ononis Natix — Hauhechel — Papilionaceen.

Goldgelber, rotgeaderter Hauhechel aus dem Wallis, nur für trockene und heisse Lage, Winterschutz, 10 cm, Juli—August.

Opuntia comanchica — Freilandopuntie, Kakteen.

Hellgelbe, grosse Blüte im Mai—Juni, trocken, heisse Lage.

- **nana**, einheimischer Feigenkaktus aus dem Tessin.

Orobus — Walderbse — Waldwicke — Papilionaceen.

Es sind dies eigentlich staudenartige, nicht schlingende Wicken, wertvolles Pflanzenmaterial als Unterpflanzung und für ganz- oder halbschattige Lagen.

- **formosus**, blau, 30 cm. Juli—August.
- **niger**, beim Trocknen ganz schwarz werdend, dunkelviolett.
- **vernus**, leuchtend karminrot, 30—40 cm. Juli.

Osmunda, Onoclea, siehe Farne.**Oxytropis** — Spitzkiel — Papilionaceen.

- **montana**, unpaariggefiederte, graufilzig behaarte Blätter, niederliegend-rasenbildend, blauweisse Blütenköpfe, 10 cm.
- — **var. alpina**, blau.
- **verna**.

Pachysandra terminalis — Euphorbiaceen.

Niedriger, immergrüner, kriechender Strauch mit weissen bis 15 cm hohen, weissen Blütenkerzen. Eine Pflanze mit grosser Zukunft. Zur Anpflanzung unter Gehölzgruppen, schattigen Böschungen, unter Bäumen, wo kein Rasen mehr gedeiht, zur Grabbepflanzung im Waldfriedhof etc.

Paeonia — Pfingstrosen — Ranunculaceen.

- **arborea typica**, baumartige Pfingstrose, grossbl., rosa, Mai—Juni, 60—100 cm.
- **herbacea rosea**, grossblumig, leuchtend rosa, gefüllt.
- **officinalis festiva maxima**, reinweiss gefüllt, Herz crème mit einigen roten Adern.
- — **rubra fl. pl.**, dunkelrot gefüllt.
- — **rosea fl. pl.**, dunkelrosa gefüllt.
- **tenuifolia**, feinzerteilte Blätter, Blüten scharlachrot, einfach, 30—40 cm. Mai.
- — **fl. pl.**, wie Vorige, gefüllt.

Papaver — Mohn — Papaveraceen.

- **alpinum**, zierliche Art fürs Alpinum in sonniger Lage und durchlässigem Boden. Blüten weiss, rot, gelb oder orange, 10—15 cm. Juni—September.
- **atlanticum**, Laub rauhaarig, Blüten orange, mehrere an einem Stengel, 30 cm. Juni—Juli.
- **nudicaule**, kräftiger Wuchs als *P. alpinum*, goldgelb, 30 cm.
- — **album**, weiss.
- — **perfecta**, grossblumig, reiches Farbenspiel in weiss, rot, rosa, gelb und orange, 30 cm. Juni—Sept.
- **radicatum**, Blätter in stark geschlitzten stacheligen Rosetten, hellorange Blüten, 30 cm. Juni—Juli.

Papaver orientale — Türkischer oder orientalischer Mohn.

Prachtvolle Rabatten und Schnittstauden mit riesigen Blumen von unübertroffener Leuchtkraft, Juni—Juli. Oft remontierend. Im Herbst 1931 habe ich Mitte Dezember die letzten Blumen geschnitten und viele Knospen sind dem scharfen Frost zum Opfer gefallen.

Goliath riesige Blumen, brennend Scharlach, bis 150 cm.

Grossfürst, dunkelrot mit grossen schwarzen Grundflecken.

Mahony. Eigenartige Färbung, kastanienbraun.

Mrs. Perry, grossblumig, lachsrosa.

Orange King, grossblumig, orangescharlach.

Oriental King, riesige Blumen, dunkelscharlach.

Perrys White, weiss mit schwarzen Grundflecken und rosa Schimmer.

Prinzess Ena, lachsrosa, Blumen mittelgross, sehr reichblühend, halbhoch.

Rembrandt, dunkel-orange.

Prinzess Viktoria Louise, zart lachsfarbig, rosa.

Parnassia pulustris — Studentenröschen — Saxifragaceen.

Grundständige Blätter, Blüten reinweiss auf einzelnen 10—15 cm hohen Stielen, feuchte Orte im Alpinum, Mai—Juli.

Paronychia — Mauerraute — Caryophyllaceen.

— **amana**, gute Bodenbedeckungspflanze von rasigem Wuchs, ins Alpinum. Blüten klein, unscheinbar, aber durch häutige, weisse Nebenblätter bedeckt, sonnige steinige Lage.

— **speciosa**.

Pentstemon — Bartfaden — Scrophulariaceen.

— **hybridum** — „**Andenken an Friedr. Hahn**“. Aeusserst dankbare Staude, die vom Juni bis zum Eintritt von Frost nicht aufhört, uns mit ihren dunkelscharlachroten Glockenblümchen zu erfreuen, 40 cm.

— — **Southgate Gem**, leuchtend zinnoberrot mit weisser Zeichnung, etwas empfindlicher und weniger hart als Vorige.

— **diffusus**, 30 cm, Blumen mittelgross, blau.

— **glaucus**, 30 cm, blauviolett.

— **pubescens**, 30—40 cm, lila in verzweigten Rispen, Juli—Sept.

— **Rattani minor**, zierliche, niedere Form fürs Alpinum. Rasenbildend, Blüten dunkelrosa, 10—15 cm. Juni—Juli.

— **Richardsoni**, Halbstrauch von 30 cm Höhe, Blüten dunkelpurpurn, für sonnige trockene Lage, Juli—September.

— **Scouleri**, niederliegend, strauchtig, Blüten gross, purpurblau, 20—30 cm, Juni—August.

— **Smalli**, 40—50 cm, verzweigte Blütenrispen, Rabatten, purpurrosa.

Petrocallis pyrenaica — Steinschmüchel — Cruciferen.

Zierliche, kleine Felsenpflanze, feine zierliche eingesägte Rosetten sind zu einem dichten, festen Polster vereinigt, rotlila Blüthen, 4—8 cm, Juni—Juli.

Phlox — Flammenblume — Polemoniaceen.

Diese Gattung schenkt uns einen überreichen Blütenflor vom frühen Frühling bis zum Herbst.

1. Frühe Frühjahrsblüher (April—Mai):

Es sind dies alles niedere Polster und rasenbildende Arten für Böschungen, Einfassungen, Trockenmauern und Felspartien.

— **amoena**, grosse karminrote Blumen, auf 10—15 cm hohen Stielen.

- **setacea** (subulata), nadelförmige, spitze Blätter in dichtem Rasenpolster, Blüten leuchtend rosa, sitzen dem Polster fast ohne Stiel auf.
- — **atropurpurea**, dunkelkarminrosa, 10 cm.
- — **C. F. Wilson**, schieferblau, eine der Wüchsigsten und Besten.
- — **Daisy Hill**, leuchtend rosa, 10—15 cm.
- — **lilacina**, zierliche, schwachwüchsig Art, blaue Blütensterne, 8 cm.
- — **Maischnee**, rein schneeweiss, im Wuchs ähnlich setacea.
- — **Moerheimi**, feine Belaubung, leuchtend rosa, 10—15 cm.
- — **Nelsoni**, schieferblau, raschwachsend, 10—20 cm.
- — **Vivid**, schwachwüchsig, herrliche, lachskarminrote Blütensterne.

2. Späte Frühjahrsblüher (Mai—Juni):

- **canadensis**, schieferblau, edle Farbtonung, grossblumig, 20—30 cm.
- **Laphami „Perry's Var.“**, grosse Blütendolden, blaulila, 40 cm.
- **pilosa**. Gute Gruppenpflanze, karminrosa, 30 cm.
- — **„Brillant“**, leuchtend karminrosa, 30—40 cm.

3. Frühe Sommerblüher. Rabatten und Schnittstauden, 40—60 cm.

Es sind dies Kreuzungen zwischen den schon genannten Phl. canad. und den nachfolgend beschriebenen Phl. decussata (paniculata).

- **Arendsi „Marianne“**, rein blauviolett.
- — **„Charlotte“**, weiss mit lila und dunklem Auge.

4. Späte Sommerphlox, starkwachsende Sorten mit glänzendem schönem Laube, prima Schnitt- und Rabattenstauden. 80—120 cm.

- **suffruticosa „Belle Pyramide“**, leuchtend dunkelkarminrosa.
- — **„Alpha“**, dunkelrosa mit dunkler Zone.
- — **„Indian Chief“**, dunkelkarminrot.
- — **„Magnificence“**, leuchtend karminrosa, kräftiger Stiel.
- — **„Perfection“**, weissrosa mit roter Mitte.
- — **„Rosalinde“**, kräftig wachsend, lockere Rispen, karmin.
- — **„Snowden“**, vollendete Rispen reinweisser Blumen.

5. Herbstphlox — **Phlox decussata** (-paniculata):

Die Herbstphlox haben sich dank ihrer Anspruchslosigkeit, ihrem gewaltigen Farbenreichtum und Manigfaltigkeit wegen in unseren Gärten einen grossen Platz erobert. Die Lage soll sonnig, aber nicht brandig sein, der Boden kräftig, frisch und durchlässig.

Adolf Ernst, lachsrot mit karmin Auge.

Aegir, samtig dunkelpurpurviolett.

Afrika, niedrige Sorte, dunelrotviolett.

Australia, karminviolett.

Baron van Dedem, scharlachrot mit dunkler Mitte, grossblumig.

Baron van Heckeren, leuchtend salmrosa.

Braga, weiss mit helllila, halbhohe Sorte.

Camillo Schneider, grossbl., feurig, karminrot.

Clara Benz, gute niedere Gruppensorte, karminrosa.

Coquelicot, brennend scharlach.

Deutschland, leuchtend orangescharlach.

Dir. Dr. Vogel, reines Blauviolett, grosse Dolden und grosse Einzelblumen

Dr. Königshöfer, scharlach mit blutrotem Auge.

Eclairer, karminviolett mit helleren bis weissen Schattierungen.

Elisabeth Campbell, riesige Dolden, lachsrosa.

Europa, grosse breite Dolden, grosse Einzelbl., reinweiss mit karminauge.
Frau Anton Buchner, grosse Dolden, reinweiss.

G. A. Ströhlein, brennend scharlach.

General van Heutsz, salmrot mit weiss.

Goliath, macht seinem Namen in jeder Beziehung Ehre, dunkelkarminrot.

Hans Vollmöller, lila mit weissem Auge.

Henry Fouquier, frühe, halbhoch, leuchtend salmrot.

Hindenburg, nieder, kompakt, samtig, blauviolett.

Jaquot Förster, dunkelblutrot.

Iris, dunkelschieferblau.

Jules Sandeau (Syn. *Württembergia*), grossblumig, Gruppensorte, rein rosa.

Karl Förster, grossblumig, dunkelorange.

Kapitän König, lachsrosa mit grossem karmin Auge.

Le Mahdi, rein dunkellila.

Loki, dunkellachs mit dunklem Auge.

Mia Ruys, beste weisse Gruppensorte, nieder, grossblumig, reinweiss.

Milly van Hoboken, grossblumig, zart lachsrosa.

Miss Ellen Willmott, eine der besten blau Getönten, riesige Dolden, reinlila mit hellerem Auge.

Mont Pelé, halbhoch, leuchtend lachs, früh.

Mrs. Rutgers, lilarosa mit dunklerem Auge, riesige Dolden.

Mrs. Scholten, dunkellachsrosa, grossblumig.

Reichsgraf von Hochberg, amarantrot.

Rheingau, weiss, grossblumig.

Rhynstroom, grossblumig, leuchtend lachsrosa.

Rosenberg, dunkel, samtig violettkarmin.

Selma, zartrosa mit kirschrotem Auge, hochwachsende Sorte.

Saladin, Neuzüchtung mit auffallendem Scharlachrot, dunkles Auge, 60 cm hoch, ausserordentlich reichblühend.

Septemberglut, riesige Dolden mit brennend scharlachroten Blumen, spät.

Sieger, grossblumig, lilarosa.

Solana, lilaviolett

Sommerglut, leuchtend rotviolett.

Sommerkleid, weiss, Mitte rot.

Wald Jenssen, zinnoberrot mit weissen Schattierungen.

Wanadis, rein lila.

Widar, helllila mit grosser, weisser Mitte.

Wiking, lachsfarben.

Zeppelin, reinweiss mit karmin Auge, 60 cm, gute Gruppensorte.

Württembergia, siehe Jules Sandeau.

Emain Macha, glühend karmin, neue, erstklassige Gruppensorte.

Physalis Franchetti — Laternenpflanze — Solanaceen.

Weisse Becherblüten in den Blattachsen, im Herbst rote Fruchtkapseln, die eine scharlachrote Beere enthalten, 60 cm.

Phygeius capensis — Scrophulariaceen.

Halbstrauch mit pentstemonähnlichen zinnoberroten Helmb Blüten, 60—80 cm, Juli—Oktober.

Physostegia virginica, falscher Drachenkopf — Labiaten.

Vierkantige Aehren, lilarosa Lippenblüten auf straffen Stielen, 100 cm, Sonne—Halbschatten, Juli—August.

Phyteuma — Rapunzel — Campanulaceen.

- **Scheuchzeri**, blaue, niedere Teufelskralle unserer Alpenweiden, Alpinum, 10—15 cm, Juni—Juli.

Plantago Cynops — Wegerich — Plantaginaceen.

Halbstrauchig-immergrün, schmallanzettl. Blätter, für heisse trockene Lage im Alpinum.

- **nivalis**, zierliche, weisszottige Art aus den Pyrenäen, sonnig, durchlässiger Boden.

Polemonium — Sperrkraut — Polemoniaceen.

- **coeruleum**, straffe Stiele, unpaariggefiederte Blätter, reinblaue Blütenrispen, 60 cm, Mai—Juni.
- — **gracile**, in allen Teilen zierlicher, 40 cm.
- **Richardsoni** (Syn. *humile*), nieder mit kriechendem Wurzelstock, grosse, helblaue Blumen, 30 cm, halbschattige und humose Stellen im Alpinum.

Polygala — Kreuzblume — Polygalaceen.

- **chamuebuxus**, immergrünes Zwergsträuchlein für sonnige—halbschattige Lage, Blüten gelb mit hellschwefelgelber Fahne, blüht oft schon im Dezember—Januar, 10—15 cm.
- — **rhodoptera**, Schiffchen der Blüte weissgelb, Fahne rot.

Polygonum viviparum — Knöterich — Polygonaceen.

Interessante Art unserer Alpen, Anstelle eines Teiles Blüten bringt die Pflanze Brutknöllchen hervor, die oft an der Mutterpflanze noch keimen und dann abfallen. Blüten rosa. 5—15 cm.

- **polystachium**, lebhaft rosa blühende Staude von hohem dekorativem Wert, 60—100 cm.
- **campanulatum**, dunkelrosa, 50—60 cm.

Potentilla — Fingerkraut — Rosaceen.

Fingerförmig zusammengesetzte Blätter, Blütenbau ähnlich einer Erdbeerblüte, lieben sonnigen Standort und frischen Boden.

- **alba**, reinweiss, unterseits weisseidige Blätter, Alpinum.
- **ambigua**, dekorative, blaugrüne Belaubung, polsterbildend, gelb.
- **argyrophylla atrosanguinea**, 30—40 m hoch, hell-dunkelrot.
- **callabra**, reizende Belaubung, Blüten mittelgross, goldgelb, 30 cm.
- **catachines**, 30—40 cm, Blüten hellschwefelgelb.
- **frigida**, olivgrüne Belaubung, Blüten weiss, 15—20 cm.
- **aurea**, niedere alpine Form, goldgelb, 5—10 cm.
- **grandis**, 40—50 cm hoch, weiss.
- **hybr. fl. pl.**, gefüllte Hybriden, 30—40 cm. Für Rabatten.
- **multifida**, Blätter mehrmals tief geteilt, Blüten mittelgross, gelb.
- **nitida**, eine der Schönsten, silberweisse, kompakte Polster. Blüten reinweiss, für sonnige, trockene Lage und durchlässigen Boden, 5—10 cm. Juli—August.
- **nivea**, kleinen, silberbehaarten Rasen bildend, weiss, 5 cm.
- **ranunculoides**, kleinblumig, gelb, 20 cm.
- **rupestris**, Blätter gleichen denen des Silbermänteli, weiss, 15 cm.
- **speciosa**, weissilberiges „Erdbeer“blatt, Blüte dunkelscharlach.
- **Tabernae-Montana** (Syn. *verna*), niedere, dichte Rasen bildend, Blüten goldgelb. Schon März—April.

- **tormentilae prostrata**, während alle *Potentilla*-blüten nach der 5zahl gebaut sind, ist dies die einzige mit nur 4 Kronblättern, niederliegend, gelb, 10 cm.
- **transcaspica**.
- **tridentata**, immergrüne, weissblühende Art aus Nordamerika. Nur im Alpinum zu verwenden, ausgesprochene Felsenpflanze, die ihre Wurzeln gerne in Felsenspalten eindringen lässt.
- **tripteris**, Blüten unscheinbar klein, gelb, Blätter bilden aber ein freudiggrünes Polster von betr. Ausmass, 10—15 cm.

Andere *Potentilla*, siehe Gehölze.

Primula — Freilandprimeln, Schlüsselblumen — Primulaceen.

Artenreiche Gattung, die uns eine Menge herrlicher Frühlingsblüher liefert. Die Primeln lieben halbschattige Lage und feuchtes humoses Erdreich.

- **Auricula hybrida**, die grossblumigen Hybriden unserer Gartenaurikeln
- **Auricula typica**, das echte, wohlriechende, goldgelbe Aurikeli oder Flieblüemli unserer Alpen.
- **Beesiana**, Asiatische Etagenprimel, die mastigen Blätter in derben Rosetten, 50—60 cm, lilapurpurn. Mai—Juni.
- **Bulleyana**, wie Vorige, Blüten in orange Tönen. Mai—Juni.
- **Bullesiana**, Hybriden der beiden Vorigen, Farbenskala von hellrosa—dunkelrot. Juni.
- **burmanica**, Etagenprimel, karmin mit orange Auge, 60 cm.
- **Briscoi**, neue Züchtung, dunkelrote Etagenprimel, 40—60 cm.
- **cashmiriana**, Blätter in grossen, grundständigen Rosetten, unterseits stark gelb-mehlig bestäubt. Blüten in grossen kugeligen Köpfen, erscheinen vor den Blättern, 30 cm. Aprii.
- — **alba**, weisse Form der Vorigen.
- **capitata**, weissbestäubte, kleine tiefblaue Kugelprimel, 15 cm.
- **denticulata**, ähnlich *cashmeriana*, ohne bepuderte Blätter, Blütenkugeln dunkellila, April—Mai, 20—30 cm.
- — **alba**, reinweisse Form.
- — **grandiflora**, grossblumig und grosskugelig.
- — **rosea**, hellrosalila.
- — „**Rubin**“, rotviolett
- **cortusoides**, herzförmige Grundblätter, Blüten leuchtendrosa, verlangt etwas Winterschutz, 20 cm. Mai—Juni.
- **Florindae**, kräftig wachsende neue Art aus China, nickende sattgelbe Blüten auf bis zu 100 cm hohen Stielen. Juni—Juli.
- **glutinosa**, niedere, zierliche alpine Art, immergrüne Rosetten, Blüten dunkelkarminrot, in Felsspalten, 3—8 cm.
- **Helenae**, tiefgrüne Blattrosetten, braunrote Nerven. Blüten samtig-purpur, 5—10 cm. Mai.
- **hybrida** „**La Lorraine**“, Blüten in Dolden, leuchtend rosa, grossblumig 20 cm. Mai—Juni.
- — **Purpurkissen**, oft auch nur als dunkle Form von *Helenae* betrachtet.
- — **Wanda**, eine der besten neuen Züchtungen, Blüten samtig purpurrot mit gelbem Auge, zur Blütezeit ein Blütenkissen. April—Mai.
- **japonica**, Etagenprimel mit dunkelkarminroten Blüten, Mai—Juni.
- — **hybrida**, Farbentöne von rosa-dunkelrot.
- — **alba**, weiss.

- **Juliae**, kaukasische Bergprimel, dichtrasige Polster bildend, Blüten sitzen dem Polster direkt auf, hellbau, 5 cm.
- **integrifolia**, Zwergprimel aus unsern Alpen, blaulila, 3—5 cm.
- **farinosa**, Mehprimel unserer Alpen, kleine kopfige Blütenstände von hellila Farbe, 8—15 cm. April—Mai.
- **luteola**, hellgelb, nickend, Juli—August, 30 cm.
- **marginata**, nur fürs Alpinum, immergrüne Blattrosetten, lila, 8-10 cm
- **pulverulenta**, Etagenprimel, grossblumig, purpurrot, 60—80 cm.
- **oblanceolata**.
- **officinalis uralensis**, Blüten klein, tief, braungelb, 15 cm. April—Mai
- **rosea grandiflora**, frühblühende Himalayaprimel, leuchtend krischrot, 8—15 cm. April—Mai.
- **saxatilis**, ähnlich cortusoides, kompakter und harter.
- **veris hybrida**. Es sind dies die vielen Gartenformen unserer einheimischen, wilden, gelben Wiesenprimel. Und zwar ist das Farbenspiel entstanden aus der Kreuzung von unserer Pr. veris elatior und der östlichen Primula Sipthorpi (Syn. Pr. acauli rosea). Diese letztere blüht früher, daher das allgemein frühere Blühen unserer Gartenhybriden.
- — — **elatior**, die Blüten sind zahlreich auf 10—20 cm hohem Stengel zu einem Blütenstand vereinigt.
- — — **coerulea**, blaue Farbentöne.
- — — **alba**, weiss mit gelbem Auge.
- — — **lutca** und **aurea**, gelbe Hybriden, grossblumig.
- — — **grandiflora**, grossblumiges, reiches Farbenspiel.
- — — **acaulis**, jede Blüte sitzt einzeln auf einem kurzen Blütenstiel.
- — — **coerulea**, hell—dunkelblau mit gelber Mitte.
- — — **alba**, cremeweiss mit gelber Mitte.
- — — **aurea**, goldgelb.
- — — **grandiflora**, grossblumiges, reiches Farbenspiel.
- — — **Weisser Schwan**, reinweiss.
- **Veitchi**, rundlich-behaarte Blätter, Blüten in zierlichen Dolden, leuchtend karminrot, 20 cm. Juni—Juli.

Pterocephalus Parnassi — niedere Dipsacee aus Griechenland, olivefarbenes graubehaartes Polster bildend, grosse rosa Blütenköpfe, sonnige warme Lage, durchlässiger Boden, 10 cm. Juli—September.

Pulmonaria azurea — Lungenkraut — Borraginaceen.

Niedrig reizend Frühlingsblüher mit tief azurblauen Blüten, gute Bienenpflanze, 20—25 cm. April—Mai.

Pyrethrum roseum hybridum — Farben-Margueriten — Compositen.

Einfache und gefüllte Margueriten im Juni—Juli, feinfiederiges Laub, erstklassige Schmuck- und Schnittstaude, frischer Gartenboden an sonniger aber nicht zu heisser Lage. Hauptsächlich die einfachen Sorten remontieren gut. 40—70 cm.

Agnes Mary Kelway, dunkelrosa, einfach, grossblumig.

Carmen Sylva, zart rosa, einfach.

Figaro, dunkelkirschrot, grossblumig, dicht gefüllt.

James Kelway, brennendrot, einfach, eine der Besten.

Lord Roseberry, dunkelkarmin, dicht gefüllt.

Miss Eileen May Robinson, einfach, leuchtend rosa, Neuheit.

Queen Mary, zartrosa, dicht gefüllt.

Pres. Roosevelt, rosa, einfach.

Yvonne Cayeux, reinweiss mit crème Mitte, dicht gefüllt.

Pyrethrum Parthenium, falsche Kamille, hellgrüne Blätter, verzweigte Blütenstände, Einzelblüten weiss mit gelber Mitte, 30—50 cm. Juni bis September.

- **Tschihatschewii**, rasenbildend, kriechend, Blüten kleine weisse Margueriten mit gelber Scheibe, 10 cm. Mai—August. Halbschattige Lage im Alpinum.
- **uliginosum**, bis 180 cm hohe Stauden-Wucherblume, weiss mit gelber Scheibe, August—Oktober.

Pyrola secundiflora — Wintergrün — Pyrolaceen.

Wintergrüne, kreisrunde Blättchen, unbeblätterter Blütenstengel mit weissen Blütenglöckchen, 8—10 cm. Mai—Juli, Halbschatten bis Schatten im Alpinum, humoser, mit Steinen durchsetzter Boden.

Ramondia — Gesneraceen, rosettige Felsenpflanze aus Südeuropa. In feuchte, nordwärts gelegene Felsspalten im Alpinum zu pflanzen.

- **Nataliae**, Aus dem Balkan, Blüten blaulila, 10 cm, Mai—Juni.
- **pyrenaica**, rein tiefblaue Blumen, 10 cm. Mai—Juni.

Ranunculus — Hahnenfuss — Ranunculaceen.

- **anemonifolius**, weiss, für feuchten Standort, 70 cm. Juni.
- **alpestris**, zierlicher, weisser Voralpenhahnenfuss, 5—10 cm, März—Mai.
- **amplexicaule**, ganze Blätter, blaugrün, grossblumig, reinweiss, sonnig aber nicht zu heiss, humoser Boden, 20 cm. Juni.
- **glacialis**, Gletscherhahnenfuss, rötliche Blüten mit stark behaartem Kelch, nur für Liebhaber, 5—10 cm. Mai—Juni.
- — **albus**, weisse Abart der Vorigen.
- **graminifolius**, schmallanzettliche Blätter, Blüten goldgelb, 15—25 cm. Juni.
- **millefoliatus**, wenige kleine, stark zerteilte Grundblätter, Blüten goldgelb, glänzend, 15—20 cm, Mai—Juni, Alpinum.
- **montanus**, niederliegender Blütenschaft, gedrungener Wuchs, grosse goldgelbe Blumen, 10—25 cm. Juni. Alpinum.
- **nissanus**, stark behaart, gelbe Blüten auf verzweigten Stielen, 20—30 cm. Mai—Juni.
- **parnassifolius**, ganzrandige, blaugrüne, dicke Blätter, weisse Blüten in stark behaartem braunen Kelch, 8—10 cm, Mai—Juni. Alpinum.

Rhododendron, Rosa, Ribes, siehe Gehölze.

Rudbeckia — Sonnenhut — Compositen.

- **hirta**, bis 2 Meter hohe straffe Staude mit goldgelben grossen Blumen, September—Oktober.
- **hybrida** „Gärtners Freude“. Verbesserte R. Neumannii mit grossen, besonders als Schnittblume wertvollen Blumen.
- **speciosa** (Syn. **Neumannii**), leuchtend orangegelbe Margueritenblume mit schwarzer Scheibe, sehr reichblühend, erstklassige Schmuck- und Schnittstaude, 60—80 cm. August—Oktober.
- **purpurea** (Syn. **Echinacea purpurea**), Strahlenblüten purpurrosa, etwas zurückgeschlagen, Scheibe überwölbt, braun mit goldigem Schimmer, robuste Staude, 100 cm, Juli—August.
- — **Leuchstern**, feurig karminrot, wenig zurückgeschlagene Petalen, Juli—September, 100 cm.

Ruta — Rutaceen — Raute.

- **chalepensis**, stark aromatische Staude mit geteilten, drüsig punktierten Blättern, aus Südeuropa. Gelbe Blüten im Juni—Aug. 40 cm
- **graveolens**, blaugraue dekorative Belaubung. 60—70 cm.

Salvia — Salbei — Labiaten.

- **hyans**, blaue Blütenrispen, 30—40 cm, Juli—August.
- **officinalis**, Medizinalpflanze von geringem Zierwert.
- **patens**, grossblumig, rein ultramarinblau, auch gute Topfpflanze, bei uns nur an geschützter Lage winterhart. 30 cm. Juli—September.
- **ringens**, grossblumig, tiefblau, 30 cm. Juni—August.

Satureya, siehe *Micromeria*. **Salix**, siehe Gehölze.

Sanguinaria canadensis — Blutwurz — Papaveraceen.

Eine in Nordamerika einheimische Schatten- und Halbschattenpflanze. Im April entfaltet sich ein grau-olivgrünes Blatt, aus dem eine weisse anemonenähnliche Blüte schießt, noch bevor das erstere recht entfaltet ist. 10—15 cm.

Saponaria — Seifenkraut — Caryophyllaceen.

- **caespitosa**, dichte kompakte Polster bildend, lebhaft rosa Blüten im April—Mai. 5—10 cm.
- **occymoides**, rotblühendes Seifenkraut unserer Alpen, 15 cm.
- — **splendens**, gedrungener und kompakter als Stammform, schön dunkelrote Blüten.

Saxifraga — Steinbrech — Saxifragaceen.

Die Steinbrecharten zeigen uns so recht den Charakter unserer Gebirgsflora, sie geben uns das typische Material für unser Alpikum und unsere Trockenmauern. Neben dem reichen Blütenflor, den vielen Farben, die sie uns schenken, sind sie es schon der meist immergrünen Rosetten und Polster in grosser Mannigfaltigkeit wert, im Steingarten gehegt und gepflegt zu werden.

1. Gruppe: *Megasea* und *Peltipyllum*.

- **crassifolia**, grosse fleischige Blätter, braun angelaufen, grosse leuchtendrosa Blütensträusse früh im Frühling, 20—30 cm, feuchte Lage, Böschungen, Unterpflanzung, Alpikum.
- — **yunnanense**, zierliche Abart der Vorigen.

2. Gruppe: *Boraphylla*.

- **nivalis**, kleine olivgrüne, gezähnte Rosette, weisse Blüten in braunrotem Kelch, 8—10 cm. Mai. Feuchter, halbschattiger Standort im Alpikum.
- **virginiensis**, amerikanischer Vertreter dieser Gruppe, weiss, 10—15 cm. Halbschatten.

3. Gruppe: *Dactyloides*.

Darunter verstehen wir die moosartigen Steinbrech, die Blätter sind in einer weichen, immergrünen Rosette zusammengefasst, meist tief eingeschnitten. Standort sonnig—halbschattig, auf jeden Fall nicht zu heiss, ansonst die Polster ausbrennen. April—Juni.

- **ceratophylla**, dunkelgrüne, kugelige Polster, reinweiss, 20 cm.

- *decipiens*, rot-weiss, 15—20 cm.
- — *alba*, weiss mit gelbem Stempel.
- — *grandiflora*, reinweiss, grossblumig, 15—20 cm.
- — *hybrida grandiflora*, rot und rosa Farbentöne, 15—20 cm.
- — *Arendsi* „Blütenteppich“, karminrosa, mit dem Verblühen etwas blasser werdend, 10 cm.
- — — „*C. Donaldson Hudson*“, dunkelkarminrot, 15—20 cm.
- — — „*Purpurmantel*“, dunkelrot, 20 cm.
- — — „*Schöne von Ronsdorf*“, karminrosa, 15—20 cm.
- *moschata*, dichtukeliges Polster, Blüten gelblich, klein.
- *muscoides*, ähnlich der Vorigen, kleine weisse Blüten, 5—10 cm.
- *Wallacei*, grossblumig, weiss, duftend.
- — *hybrida*.
- *pedemontana*, grossblumig, weiss.
- *irrigua*, grosse, meist einzelne Rosette, weiss, 20—30 cm.

4. Gruppe: *Euaizonia*e.

Die Rosetten sind meist weiss gerandet (kalkausscheidende Grübchen), hart und immergrün. Vielblütige rispige Blütenstände, 15—50 cm, Mai—Juli.

- *aizoon*, weiss, die härteste der Gruppe.
- — *balcana*, breite Rosetten, Blüten, rahmweiss, rot punktiert.
- — *brevifolia*, mittelgrosse, stumpfblättrige Rosetten, weiss.
- — *Churchilli*, kugeliges Polster, graugrün, reichblühend, weiss.
- — *cultrata*, langblättrige dekorative Rosetten, Blüten schneeweiss.
- — *crustata*, mittlere Rosetten, sehr stark kalkausscheidend.
- — *Jaquini*, Blüten rahmgelb.
- — *maculata*.
- — *minor*, kleine Rosetten, nieder und zierlich, weiss.
- — *orientalis*.
- — *repens*, Ausläufer treibend.
- — *retusa*, stark abgestumpfte, kleine Rosetten.
- *Camposi*, sehr lange reinweisse Blütenrispen.
- *Cochlearis*, spatelförmige Blätter, fast ganz bekalkt, zierliche Blütenrispen von reinweisser Farbe, halbkugelige Polster.
- — *major*.
- — *minor*, zierlicher als Stammform.
- *Farreri*, langblättrige Rosetten, blaugrün.
- *Gaudini*. Nat. Hybride zwischen *aizoon* und *Cotyledon*.
- *Hostii*, Rosetten graugrün, Spitzen heruntergebogen, Blüten schneeweiss mit rotbraunen Punkten.
- — *raetica*.
- *intacta minor*, langblättrige, stark bekalkte Kulturform, weiss.
- *lingulata*, Rosettenblätter spatelig, sich allmählich zuspitzend, Blütenstände robust, bis 60 cm, reinweiss.
- — *lentoscanan*, Blätter kürzer, nicht so stark inkrustiert.
- — *hybrida*.
- *Mac Nabiana*, grosse, saftiggrüne Rosetten, bis 60 cm hohe, viele Blütenrispen.
- *Montavonensis*, breitblättrige, braun angelaufene Rosetten.
- *marginata*, kleinrosettig, nieder, stark inkrustiert.
- *pectinata*, schmalblättrige, kleine Rosetten, die für diese Art wirklich typisch sind, weiss.

- **Portae**, kleine, runde, zierliche Rosetten, 10 cm hohe Blütenrispen.
- **pyramidalis** (Syn. *S. Cotyledon pyramidalis*). Die blühende Rosette stirbt nach dem Verblühen ab, einzelne Rosetten bis 15 cm. Durchmesser, Blütenstände weiss, bis 70 cm.
- **Sturmii**, eine der zierlichsten Formen aus dieser Gruppe.
- **Timbalii**.
- **Zimmetri**, dichte, kugelige Rosetten, 10 cm hoch.
- **aizoon lutea**, gelbliche Blüten.

5. Gruppe: Kabschia.

Unstreitig finden wir darunter die zierlichsten, schönsten und interessantesten Arten. Die Polster sind dicht. Die einzelnen Rosetten gehen oft in einem Gewirr von schmalen Nadelblättern unter. Die meisten Arten blühen sofort nach der Schneeschmelze, und öffnen die ersten Blüten, wenn die Stiele noch kaum 1 cm hoch sind. Blüten einzeln oder in 3—8 zähligen Köpfchen.

- **Alberti**, sattgelb mit braunrotem Stiel und Kelch.
- **apiculata**, hellschwefelgelb, sehr dankbarer Blüher.
- **Boryi**, reinweiss mit dunkelgrünem Stiel und Kelch.
- **caesia**, blaugrüne, feine Polster, ebenfalls kalkausscheidend, Blüten weiss mit bläulichem Schimmer, Juli—August.
- **coriophylla**, flache Polster, weiss.
- **Elisabethae**, stachelige, graugrüne Polster, Blüten gelb, Kelch braun.
- **Ferdinandi-Coburgi**, weiss.
- **Haagi**, goldgelbe Polster, etwas spärlicher Blüher.
- **marginata**, weiss.
- **ochroleuca**, olivegrünes Polster, Blüten gelb, Stiel u. Kelch rotbraun.
- **Paulinae**, halbkugeliges, hartes, blaugrünes Polster, Blüten gelb, Stiel und Kelch rot, 2—5 cm.
- **pseudo-Fosterii**
- **pseudo-sancta**, grosse, saftiggrüne Polster, etwas nachlässiger Blüher.
- **pseudo-valdensis**, reinweiss.
- **pungens**, stacheliges, tiefgrünes Polster, Blüten goldgelb.
- **rigescens**.
- **Rochelliana**, weiss, Stengel und Kelch rotbraun.
- **sancta**, saftiggrünes Polster, goldgelbe Blütenköpfchen. Eine der am raschesten Wachsenden.
- **sancta x juniperina**.
- **scardica**.
- **Salomoni**, eine der frühesten, blauweisse Blüten, kastanienbraune Stiele und Kelche.
- **valdensis**, ähnlich cochlearis, weiss.
- **minor**, zierliche Zwergform der Vorigen.

Alle Kabschia-Sorten lieben Sonne, aber nicht zu heissen Standort, frischen, durchlässigen Boden, es empfiehlt sich auch, die Polster beim Pflanzen mit Kies oder Sand zu unterlegen.

5. Gruppe: Angustiana.

- **Stuarti**. Rosettenblätter spitz, nach abwärts gerichtet, blaugrün, Blüten kurz am Stengel aehrig angeordnet, grosse rötlichgefärbte Hochblätter.

6. Gruppe: Miscopetalus und Nephrophyllum.

- **granulata**, runde dicke, grundständige Blätter, Blüten weiss, auf 20 bis 30 cm hohen Stielen. Juni—Juli.
- **rotundifolia**, weiss, 20 cm. Juni.

7. Gruppe: Porphyrion.

Kriechende Sorten für nur feuchte nördliche od. halbschattige Lage.

- **oppositifolia**, rasig-niederliegend, Blättchen fast schuppenförmig, Blüten einzeln, violettrot, 5—10 cm. April—Mai.
- — **latina**, sehr grossblumig, leuchtend rot, gilt als beste Art.
- — **speciosa**, grossblumig, dunkelpurpur.

8. Gruppe: Robertsoniana.

Rasig sich ausdehnende Rosetten, hellgrün, oft braunrot angelaufen, Blütenschäfte zierlich, Blüten fein, rötlich mit weiss. Für Halbschatten.

- **cuneifolia**, Rosettenblätter verkehrt spatelig, Blüten rosa, 15 cm, Juni—Juli.
- **umbrosa**, ähnl. der Vorigen, aber im ganzen Aufbau robuster, 20 cm
- **cuneifolia apennina**.

9. Gruppe: Trachiphyllum.

- **androsacea uniflora**, kleines, immergrünes Polster, Blüte weiss, einzeln auf kaum zentimeterlangem Stiel, 2—5 cm.
- **aizoides**, lanzettlich fleischige Blätter, rasiger Wuchs, ohne Rosetten, Blüten gelb, sternförmig, für feuchte und nasse Standorte, Nordlage im Alpinum. 10 cm. Juni.
- **aspera**, dichtpolsterig, saftiggrün, Blüten weissgelb mit orange Tupfen, 6—10 cm, Juni—Juli.
- — **bryoides**.
- **bronchialis**, nordamerikanische Form.
- **tenella x aspera**, hellgrüne, spitzblättrige, dichte Polster, Blütenstände 8—10blütig, reinweiss, 10—15 cm. Mai—Juni.

Scabiosa — Dipsaceen.

- **caucasica**, blaue Blütenköpfe auf langen, festen Stielen, vom Juni—Herbst, prima Schnittstaude, 60 cm.
- — **alba**, weiss.
- — **perfecta**, rein himmelblau.
- — **Schöne von Eisenach**, grossblumig.
- **graminifolia**, niedere Art für sonnige Lage im Alpinum. Schmallanzettliche, silbergraue Blätter, reinblauer Blütenkopf im Juni—Aug., 20—30 cm, durchlässiger Boden.

Scilla, siehe Zwiebelgewächse — Scolopendrium, siehe Farne.**Scutellaria — Helmkraut — Labiaten.**

- **alpina**, niederliegend aufstrebend, blauviolette Helmblüten in Aehren, 10—20 cm, frischer Boden, sonnig, Juli—August.
- — **coerulea**, hellblauer Helm, weisse Lippe.
- — **lupulina**, gelb mit weiss.
- **baicalensis coelestina**, aufrechter Wuchs, straffe Stengel, 60 cm. Juli—August, trockene, sonnige Lage.
- **orientalis**, olivgraugrüne Belaubung, fiederschnittig, lockere Rasen bildend, Blüten rein gelb, 10 cm. Juni—August.
- **peregrina**, kleinblumig, dunkelblau, 40 cm. Juni—Juli.

Sedum — Mauerpfeffer — Fetthenne — Crassulaceen.

Anspruchslose, meist niederliegend rasige Stauden mit fleischigen Blättern und traubigen oder doldigen Blütenständen. Zur Bepflanzung von Trockenmauern, magere, trockene, warme und durchlässige Standorte im Alpinum, auch zur Böschungsbepflanzung oder als Bordüre. Einige wenige hohe Arten als Schmuck-, Schnitt- und Rabattenstauden. Juli—August.

- **acre**, saftiggrüne Rasen, Blüten goldgelb, 10—15 cm.
- **minor**, zierliche Zwergform der Vorigen, 5—8 cm.
- **adsingens**, Blättchen kugelig, fleischig, rotbraun angelaufen, Stengel rotbraun, Blüten gelb, 5—10 cm.
- **album**, lockerrasiges Polster, weiss, geht auch an Nordlagen.
- **Anacampseros**, kreisrunde Blätter, Blütenstiele 15 cm, Blüten purpurrota, verträgt auch Halbschatten.
- **camtschaticum**, länglich ovale Blätter, bis 20 cm, Blüten orange
- **fol. var**, Blätter panaschiert.
- **coeruleum**, zierliche, blaugrüne Polster, meist nur 2jährig, sät sich aber immer selbst wieder aus, 5—10 cm.
- **Crista-Galli**, blaugrüne, nadelförmige Blätter, rasig, orangegelb.
- **hybrida**.
- **dasyphyllum**, weisslich-blaue Rasen, 2—3 cm. Blüten zart-rosa.
- **divergens**, kugelig aufgeblasene Blättchen, rotbraun, Blüten gelb.
- **Douglasi**, steifblättrige, blaugrüne Polster, Blüten orange, eine der Besten, 20 cm.
- **hybrida**.
- **Ewersi**, besonders im Austrieb schön, blaugrün, Blüten rosa.
- **turkestan.**
- **Forsterianum**, zierliche, blaugrüne Rasen, die im Herbst sich braunrot verfärben, Blüten gelb, 10—15 cm.
- **majellense**.
- **Middendorffianum**, Belaubung zierlich, rotbraun, der neue Austrieb erfolgt bereits im Herbst und überwintert als zierlich braunrote Rosette, Blüten gelb, 15—20 cm.
- **diffusum**.
- **multiceps**, Triebe am Ende mehrköpfig, blaugrün, gelbe Blüten.
- **Newii**, blaugraue Rosetten in dichtem Polster, Blüten weiss, 10 cm
- **nigricans**, Fetthenne unserer Alpen, 3—5 cm, gelbbraune Blüten.
- **obtusatum** (Syn. *oregonum*). Rasen lebhaft grün, meist aber lebhaft purpurrot angelaufen, Blättchen dick fleischig, Blüten gelb, 5—7 cm Aus dem Westen der U. S. A.
- **reflexum**, blaugrüne Rasen, dunkelgelbe Blüten, 10 cm
- **rupestre**, dichtrasig-niederliegend, gelb, 10—15 cm.
- **Sieboldi**, Oktoberli, auch geschätzt als Topf- und Ampelpflanze.
- **fol. var.**, weiss panaschierte Blätter.
- **spathulifolium**, weiss und violett bereifte volle Rosetten, Blüten gelb, 10 cm. Juni.
- **spurium**, lockerrasiger Wuchs. Als Rasenersatzpflanze für halbschattige und schattige Lagen, Deckpflanze für Zwiebelpflanzungen, rosa, 10 cm. (geht auch unter *stoloniferum*)
- **splendens**, leuchtend rot.
- **album**, weiss.
- **spectabile** „Brillant“, prima Rabatten und Gruppenstaude, 30—40 cm, leuchtendrote, breite Blütendolden im August—September,
- **Verlotti**, goldgelb, 10—15 cm,

Sempervivum — Hauswurz — Crassulaceen.

Der Engländer hat eine treffende Bezeichnung: „Hen and chickens“, die Henne mit den Kücklein, so gruppieren sich die jungen Rosetten um die Alten. Grosse Manigfaltigkeit in der Form und Färbung der Rosetten und Blüten. Gedeihen an mageren, steinigen Orten noch, wo andere Pflanzen versagen, Alpinum, Steinritzen, Trockenmauern, die grösseren robusten Arten auch für Einfassungen, sonnig.

- **acuminatum**
- **alpinum**
- **arachnoideum**
- — **x Gaudini**
- **angustifolium**
- — **hybridum**
- **arenarium**
- **barbulatum**
- **Berlignianum**
- **blandum**
- **Braunii**
- **crassicaulis**
- **debile**
- **erythraea**
- **elegans**
- **Fauconnetii**
- **glaucum**
- **dolomiticum**
- — **hybridum**
- **helveticum**
- **Heuffelii**
- **Juraensis**
- **kopankense**
- **Laggeri**
- **majellense**
- **minutum**
- **montanum**
- — **x alpinum**

Sempervivum murale

- **patens**
- **pauciflorum**
- **pilosellodes**
- **Pittonii**
- **Pomeli**
- **Prunetti**
- **pumilum**
- **pusillum glaucum**
- **Reginae Amalia**
- **rubicundum**
- **Schotti**
- **soboliferum**
- **tectorum**
- — **atropurpureum**
- — **helveticum**
- — **speciosum**
- — **typicum**
- — **violaceum**
- **tomentosum**
- **triste**
- — **violaceum**
- **validum**
- **Wulfenii**

Senecio — Kreuzkraut — Compositen.

- **abrotanifolius**, mehrmals fiederig geteilte Blätter, dunkelorange Blütenköpfchen, 20—30 cm. Juni—Juli, sonnig, steiniger durchlässiger Boden.
- **adonidifolius**, ähnlich der Vorigen, Blüten gelb, 30—40 cm.
- **carniolica**, olivefarbene, weissfilzige Blätter, Blüten gelb, 5—15 cm, sonnige Lage im Alpinum. Mai—Juli.
- **Doronicum**, gelbe Margueritenblume, auf 30—40 cm hohen Stielen.

Shortia galacifolia — Winterblatt — Diapensiaceen.

Es ist dies die amerikanische Soldanelle, Blätter rundlich, meist rotbraun, immergrün, grosse weisse gefranste Blütenglocken auf ca. 10 cm hohem Stiel, Mai—Juni. Halbschattige Lage in humosem Boden.

Sideritis hirsuta — Gliedkraut — Labiaten.

Weissfilziger Halbstrauch, hellgelbe Helmb Blüten in Rispen. Sonnig, trockener und steiniger Standort, 20—30 cm.

Sieversia reptans — Sieversie — Rosaceen.

Fiederschnittige Blätter in grundständigen Rosetten. Ausläufer treibend. Alpine aus den Moränen und Schutthalden, Blüten gross, goldgelb., ganze Pflanze wollig behaart, sonnige aber feuchte Lage, sandiger durchlässiger Boden. 10 cm. Juni—Juli.

Silene — Leimkraut — Caryophyllaceen.

- **acaulis**, moosartige Polster, sattgrün, leuchtend rosa Blüten, direkt auf dem Polster aufsitzend. 3—5 cm. Mai—Juni. Alpinum.
- — **Villarsii**. Form der Vorigen, aus den Westalpen.
- **alpestris**, sattgrünes Polster mit einer Fülle reinweisser Blüten im Mai—Juni, 15 cm. Eine der Besten. Sonlig.
- **Armeria**, 30 cm, Blüten gross, langröhrig, purpurrosa.
- **Asterias**, Blüten in kugeligen Köpfen, purpurrosa, 30—40 cm.
- — **grandiflora**, grossblumig.
- **longiflora**, immergrüne, grundständige breitblättrige Rosette, Blüten weiss, 20—30 cm. Juni—Juli, sonnig, durchlässiger Boden.
- **maritima**, kriechend, blaugraue Belaubung, Blüten weiss, 10 cm.
- **Melampyrum**, rosa. 30 cm. Juli.
- **multicaulis**, zierliches, zwergiges Polster, Blüten reinweiss, 10 cm.
- **paradoxa**, grosse, breitblättrige Rosette Blüten cremeweiss, 30 cm.
- **pennsylvanica**, lanzettblättrige Rosette, Stengel niederliegend, Blüten gross, dunkel, weinrot, 10—15 cm. Juni.
- **pyrenaica**, lockerrasig, Blüten rosa auf verzweigten Stielen, 10 cm.
- **Reichenbachii**, lockeres Polster, Blüten reinweiss, 10—15 cm.
- **Saxifraga**.
- **Schafta**, lockerrasig, Blumen gross, purpurrosa, 10 cm, Aug.—Sept.
- **staticaeifolia**, zierliche immergrüne Blattrosette blaugrün, Blütenstengel mehrblütig, 15—20 cm. weiss, Juni.
- **tatarica**, 30 cm, weiss, Juli—August.
- **Zawadsky**, grosse immergrüne Blattrosetten, blaugrün, braun angelaufen, Blütenschaft 30—40 cm., weiss, Juni—Juli.
- **Valesiae**, niedriges, hellgrünes Polster, klebrig behaart, Blüten aussen braun, innen weiss, 10—15 m, Juni—Juli.
- **virginica**, Blüten gross, eigent. scharlachrot, 30 cm, verzweigte Blütenstände, Mai—Juni, nur für geschützte, warme Lage im Alpinum, nahrhafter, durchlässiger Boden.

Soldanella — Alpenglöckchen — Primulaceen.

- **alpina**, kreisrunde, immergrüne Blättchen, Blütinglöckchen purperviolett, zu 2—3 an einem Stengel, 10 cm, März—April, feuchte Lage im Alpinum.
- **montana**, mehrblütige Stengel, 10—15 cm. April—Mai.
- **pusilla**, Stengel einblütig, hellrotviolett, 8—10 cm.

Solidago — Goldrute — Compositen.

- **alpestris**, niedere Art fürs Alpinum, gelbe, stumpfe Blütenrispen im Juli, 25 cm, sonnig.
- **aspera**, bis 100 cm hohe prächtige Rabatten- und Schnittstaude, überhängende Blütenrispen, gelb, August—September.
- **brachystachia**, niedere Zwergform, nur fürs Alpinum, wo sie mit der blauen *Micromeria illyrica* zusammen einen herrlichen Effekt hervorbringt, 10 cm, September—Oktober,

- **canadensis**, alte Stammform, die sich auf straffen Stengeln, ohne Auffinden gut trägt, zum Verwildern. 180 cm, gelb, August—Sept.
- **hybrida**, „Frühgold“, frühblühende Art, 100 cm. August.
- — „Goldelie, zierlicher überhängender Wuchs, elegante, stark verzweigte, goldgelbe Blütenrispen, 80 cm. August—Sept.
- — „Golden Wings“, grosse breite federige Blütenstände, hervorragende Schnitt- und Rabattenstaude, 150-180 cm, September—Okt.
- — „Goldschleier“ straffer Wuchs, grosse Rispen, 80 cm. August—September.
- **Ridalli**, schmallanzettliche, blaugrüne Blätter, 80—100 cm, Septemb.
- **Shortii**, leichte, federige Rispen, goldgelb, September, 150 cm.
- **Virgaurea nana**, niedrig kompakter Wuchs, gedrungene goldgelbe Rispen im Juli—September. Wertvolle Art für schmale Rabatten, 40 cm.

Spiraea — Spierstaude — Rosaceen.

- **filipendula hexapetala fl. pl.**, fiederschnittige, dunkelgrüne Blätter in grundständiger, grosser Rosette, Blüten in breiter federiger Rispe, rahmweiss, dicht gefüllt, 30 cm, Juni.
- **gigantea carnea**, dekorative Belaubung, dunkelrosa Blütenrispen, bis 2 Meter hoch. Juli—August, feuchter Standort.
- **palmata**, 100 cm, dunkelrosa, Juni—Juli.
- **Ulmaria fl. pl.**, prachtvolle Schnittstaude, Blüten reinweiss gefüllt, in breiten, grossen Blütenrispen, 80—100 cm, Juni—Juli.
- **venusta magnifica**, karminrote, grosse, federige Blütenstände, 100—150 cm. Juni—August.

Andere **Spiraea**, **Syringa**, **Spartium**, siehe Gehölze.

Sternbergia, siehe Zwiebelgewächse.

Stachis lavandulifolia — Ziest — Labiaten.

Schmallanzettliche, silbrig behaarte Blätter, rotpurpure Blüten, 15 bis 20 cm, für trockene, warme Lage, im Alpium, Juli

Statice — Schleierkraut, Strandflieder — Plumbaginaceen.

Lederartige, ganzrandige Blätter in einer grundständigen Rosette, immergrün, grosse, breite, schleierartige Blütendolden, tiefgründiger Boden und sonnige, warme Lage. Juni—August.

- **Besseriana**, rötlichlila, 30—40 cm.
- **incana hybrida nana**, weiss, 25—30 cm.
- **spatulaefolia**, lila, 30 cm.
- **tatarica**, weiss-zartrosa, 30 cm.
- **latifolia**, blau, 40 cm.

Symphandra — Campanulaceen, Felsenstauden mit hängenden, grossen Blüten.

- **Hoffmanni**, rahmweiss, 30 cm hoch, Halbschatten, Juli—August.
- — **pendula**.
- **Wanneri**, weiss, liebt sonnigen Standort, 30 cm, Juli.

Symphytum officinale album — Beinwell, Wallwurz — Boraginaceen.

Weisse Blüten an spiralig sich öffnendem Blütenstand, sonnig—halbschattig, 40 cm. Juni—August.

Tamarix, Taxus, Thuya, siehe Gehölze.

Tulipa, siehe Zwiebelgewächse.

Teucrium — Gamander — Labiaten.

- **aragonense**, blauviolettblühende Felsenpflanze für sonnige Lage.
- **flavum**, weissfilzig behaart, hellgelb, 15 cm, Juni—Juli.
- **Chamaedrys**, immergrünes Halbsträuchlein mit purpurrosa Blüten vom Juni—September, auch für Einfassungen, da es den Schnitt sehr gut verträgt, 20 cm.
- **montanum**, niederliegend, rasenbildend, Blüten hellschwefelgelb, für sonnige, heisse und steinige Standorte im Alpinum, 5 cm
- **pyrenaicum**, gelb.
- **Scorodonia**, purpurrosa, 30 cm, für Halbschatten.

Thalictrum — Wiesenraute — Ranunculaceae.

Akeleiähnliche dekorative Belaubung, kleine bis mittelgrosse hängende Blüten mit weit hervortretenden Staubgefässen, an lichten stark verzweigten Blütenständen. Lieben tiefgründigen humosen Boden und halbschattige Lage.

- **adanthifolium**, feine blaugrüne Blätter, Blüten lila, 40 cm.
- **aquilegifolium**, zartrosa mit lila, 80—100 cm
- **diptercarpum**, rosallila mit gelb, prima Schnittstaude, 80—100 cm. Juli—August.
- **flavum**, bis 150 cm hoch, grossbl., hellschwefelgelb, Juli—September
- **galioides**.
- **glaucum**, dekorative, blaugrüne Belaubung, Blüten gelb, 100—120 cm, Juni—Juli.

Thlaspi — Täschelkraut — Cruciferen.

- **montanum**, reinweisse Felsenpflanze von grossem Wert. Sonne—Halbschatten, durchlässiger Boden, 20 cm. Mai—Juni.
- **speciosum**.

Thymus — Thymian, Quendel — Labiaten.

Aromatische Stauden und Halbsträuchlein für Alpinum, Trockenmauern und Fugenbepflanzung in Plattenwegen.

- **azoricus**, graugrün belaubtes Sträuchlein für sonnige und trocken-heisse Lage im Alpinum. 25 cm. Blüten helllila.
- **arizonicus**, kugelig polsterbildend, dunkelsattgrün, Juni—August.
- **citriodorus fl. var.**, zierlich belaubtes Sträuchlein mit weiss panaschierten Blättchen, 30—40 cm. Blüten lilaviolett.
- **hinearis**, olivegrün belaubtes Sträuchlein.
- **montanus**, nieder, rasenbildend, weiss, Juni—Juli.
- **serpyllum**, dichtrasig, braungrün, Blüten dunkelrosa, 5 cm
- — **splendens**, dunkelpurpur.
- **lanuginosus**, dichtrasig-kriechend, ganze Pflanze grauwoilig behaart, Blüten klein, dunkelpurpurrot, 5 cm.

Tofieldia alpina — Tofieldie — Liliaceen.

Grasähnliche Blätter und ebensolcher Wuchs, grüngelbe Blütenköpfe im Juni—Juli. 10—15 cm. Sonne—Halbschatten.

Trifolium alpinum — Alpenklee — Papilionaceen.

Purpurrosa, grosse Blütenköpfe, sonnig-heisse Lage, durchlässiger, steiniger Boden, Alpinum, 10 cm.

Trillium grandiflorum — Waldlilie — Liliaceen.

Einfacher Stengel mit 3 grossen quirligen Blättern, Blüte reinweiss, in der Dreizahl aufgebaut, 20—30 cm, humoser Boden, Halbschatten, April—Mai.

Tritoma — Fackellilie — Liliaceen.

- **hybrida „Express“**, schmallanzettliche, schilfähnliche Blätter, Blüten auf starkem Stengel in dichten Kolben, die von unten nach oben aufblühen, leuchtend orange, gelb und orange schattiert, 80—100 cm, Juli—September.
- **Uvaria**, reichblühend, feurig orangerot mit gelb, 80 cm.

Trollius — Trollblume — Ranunculaceen.

Dankbare, reichblühende Frühlingsblumen für feuchten, am besten halbschattigen Standort, hahnenfussähnlich zerteilte Blätter, Blütenblätter schliessen sich oben ballenartig.

- **asiaticus**, orangegelb, kräftig wachsend, 60 cm.
- **chinensis**, rotorange mit dunkleren Honigblättern, 50 cm.
- **europaeus superbus**, Kulturform unserer einheimischen Trollblume, grossblumig, hellschwefelgelb, 40—50 cm.
- **hybridus „Earliest of All“**, hellorange, grossbl., früh.
- — **Etna**, orange, grossblumig.
- — **Empire Day**, grossblumig, leuchtend orange, früh.
- — **Fire Globe**, feurig dunkelorange.
- — **Golden Wonder**, goldig orange.
- — **Lichtball**, riesige, festgeschlossene Ballen, hellorange
- — **Newry Giant**, riesenblumig, hellorange.
- — **Orange Globe**, reichblühende Art, leuchtend goldorange.
- — **Salamander**, orange.

Tunica Saxifraga — Felsennelke — Cariophyllaceen.

Niederliegendes, rasiges Nelkengewächs mit schmallinealen Blättern und einer Fülle rosa Blüten im Juni—September. 10—20 cm, sonnige, trockene Lage in gut durchlässigem Boden.

Umbilicus chrysanthus — Nabelwurz — Crassulaceen.

Graugrüne, fleischige Blattrosetten, die einem Sempervivum ähneln, kugelig geschlossen. Blüten reinweiss auf 10—15 cm hohen Stielen Williger Blüher. Trockener, durchlässiger Standort im Alpinum. Juni

- **oppositifolius**, hellgrüne Belaubung, Blüten gelb, 10 cm, Mai—Juni.

Uvularia — Zäpfchenkraut — Liliaceen.

- **grandiflora**, nordamerikanisches Liliengewächs für humosen Boden und halbschattige Waldlage. Hübsche blaugrüne Belaubung, hängende, gelbe Blüten, April—Juni, 30 cm.
- **sessiliflora**, grossblumig, reichblühend, 25—30 cm.

Vaccinium, siehe Gehölze.

Valeriana — Baldrian — Valerianaceen.

- **alpestris**, runde freudiggrüne Blättchen, zart hellrosa, 10 cm
 - **rotundifolia**, rosa, kalkliebend, 2—5 cm.
 - **supina**, weissrosa, 5—8 cm, kalkliebend.
- Alle drei hier angeführten Arten lieben sonnigen Standort im Alpinum, durchlässiger, aber nicht brandiger Boden. Mai—Juli.

Veratrum — Germer — Liliaceen.

- **nigrum**, parallelnervige, grosse Blätter, bis 120 cm hoher straffer Blütenschaft mit dunkelpurpurbraunen Blüten. Für diese Art geschützte Lage, vor zu grosser Winterfeuchtigkeit zu schützen. Juli—August.

Verbascum — Königskerze — Scrophulariaceen.

- **pannosum**, ganze Pflanze wollig zottig, gewaltige grundständige Blattrosetten, bis 2 Meter hohe Blütenschäfte. Blüten schwefelgelb, Stengel und Staubgefässe rötlich. Juli—August.

Veronica — Ehrenpreis — Scrophulariaceen.

Mit wenig Ausnahmen verwenden wir die Veronica im Steingarten, in Trockenmauern, Bordüren oder Böschungen, nur einige wenige werden als Rabattenstauden verwendet.

- **alpina**, kriechend-rasig, hellblau, kleinblumig, 10—15 cm.
- **aphylla**, kleine grundständige Rosetten, reinblaue Blüten, 5—10 cm.
- **arenaria**.
- **armena**, Belaubung fein, fiederschnittig, hellgrün, Blüten leuchtend rosa, 10—15 cm. Mai—Juni.
- **buxifolia**, immergrünes Zwergsträuchlein aus Neuseeland, kreisrunde Blättchen, quirlig um die Zweige, 15 cm, für trockene, warme Lage im Alpinum.
- **glaucophylla**, ähnlich der Vorigen, aber robuster im Aufbau, Blätter blaugrün, 30—40 cm.
- **epacroides**, Blätter schuppenförmig um die Zweige, lockeres, immergrünes Polster bildend, Blüten hellblau, Juni—Juli, 10 cm.
- **fruticulosa**, immergrüne tiefgrüne, runde Blättchen, Blüten dunkelblau, kopfig am Ende der Triebe, lockerrasig, 5—10 cm, Juni—Juli.
- **Hectori**, interessante, immergrüne harte Art aus Neuseeland. Blätter fest schuppenförmig am Trieb angepresst, so dass derselbe wie ein blattloses, rundes Stämmchen aussieht, sonnig und durchlässiger Boden, 30 cm.
- **Hendersoni**, dunkelblaues, Rabatten- u. Schnittehrenpreis, lange vielblütige Rispen, 80—100 cm. Juli—August.
- **incana**, weissfilzige Blätter, ausgebreitet, dunkelblaue bis 20 cm hohe Rispen, Juni—Juli, gute Bordürenpflanze und für den Steingarten.
- **Matthensi**, gehört in die gleiche Gruppe wie *buxifolia* und *glaucophylla*, hellgrüne, grössere Belaubung mit braunem Rand, Blüten rosaweiss, 40—50 cm. Juli—August.
- **macroura**, lange, gezähnte Blätter, Rispen aus den Achseln entspringend, violettrot, 50—60 cm. Winterschutz, August—September.
- **pinguifolia**, reizende Art aus der Gruppe der Neuseeländer, zierliche blaugrüne, immergrüne Blätter mit rötlichem Rand, 15—20 cm, gedrungene feste Büsche bildend, Blüten weiss.
- **Prenya**, fiederschnittige, sommergrüne Blätter, Blütenstand stark verzweigt, mit grossen reinblauen Blumen, 30—40 cm. Sonnige Lage, Alpinum.

- **prostrata**, niederliegend, dichte Rasen bildend, zahlreiche tiefblaue Blütenstände, 15—20 cm. hoch, eine der Besten. Alpinum, Böschungen, Trockenmauern und Bordüren. Mai—Juni.
- **satureioides**.
- **saxatilis**, immergrüne Büschchen bildend, die dunkelgrünen Blättchen sind rings um den Stengel, Blüten rein blau. Sonnig und warm, durchlässiger Boden, 15 cm.
- **stenophylla**. Eine Neuseeländerart mit schmallanzettl. Blättern, hellgrün, sehr dekorativ, leider etwas empfindlich. Winterschutz, 30 bis 40 cm.
- **Stokesiana**, niederer, immergrüner Halbstrauch mit rein blauen Blütchen, trockene, warme Lage im Alpinum, 10 cm. Juni—Juli.
- **subalpina**, eine immergrüne Neuseeländerart, die der *pinguifolia* sehr nahe kommt, etwas robuster im Aufbau. 25—30 cm.
- **Traversi**, zur gleichen Gruppe wie Vorige, hellgrün, raschwachsend, weisse Blütenähren. 50—70 cm.
- **surculosa**, niederliegend, lockerrasig, ganze Pflanze grauwoilig behaart, Blüten tief dunkelblau, 10 cm, Juni—Juli.
- **verruculosa**.

Viburnum — siehe Gehölze.

Vinca minor — Immergrün — Apocynaceen.

Gewöhnliche, blaublühende Art für Unterpflanzung, Böschungen und Bordüren.

- **major**, grossblättrige Art mit grossen, reinblauen Blumen, Juni.
- — **fol. arg. var.**, Laub weiss panaschiert.

Vincetoxium alpinum — Asclepiadaceen.

Glänzend tiefgrüne Blätter, Blüten gelblichweiss, für steinigen Boden an sonniger Lage im Alpinum, 20 cm. Juni—Juli.

Viola — Veilchen — Violaceen.

- **biflora**, kleinblumiges, goldgelbes Veilchen unserer Alpenwälder, stets zwei Blüten beisammen, nur im Steingarten, an feuchter und schattiger Lage, 10 cm, Juni.
- **cornuta** — Hornveilchen oder kleinblumige Pensées genannt.
- — **Blaue Schönheit**, reinblau.
- — **Papilio**, hellblau mit weiss.
- — **lutea splendens**, goldgelb.
- — **Hansa**, tiefdunkelblau, einer der Besten dieser Klasse.
- **calcarata**, zwergige einheimische Alpine mit riesigen Blumen, hellblau mit gelb, 5—8 cm, feuchte Lage im Alpinum, liebt kiesigen Grund, da eine typische Moränenpflanze, Juli—September.
- **gracilis** „**Lord Nelson**“, kriechender Wuchs, aufrechte Blütenstengel, Blüten zart, blau, 10—15 cm. Mai—August.
- **odorata**, wohlriechendes Veilchen.
- **pedata**, nordamerikanische Zwergsorte, fingerförmig geteilte Blätter, Blüten dunkelviolett und hellblau, 5—8 cm.
- — **bicolor**.

Wahlenbergia (Syn. *Platycodon*) — Campanulaceen.

Aufrechte, blaugrün belaubte Stauden für Sonne und Halbschatten.

— **grandiflora**, Blüten bis 8 cm Durchmesser, reinblau.

— **alba**, weiss, Juli—August, 50—70 cm.

— **Mariesii**, reichblühend, nur 15—20 cm hoch.

Wulfenia carinthiaca — Scrophulariaceen.

Blaue Blütentrauben, glänzend dunkelgrüne Blätter, dichtrasiger Wuchs, 15 cm. Für Halbschatten in humosen Boden, Juni—Juli.

Yucca filamentosa — Palmlilie — Liliaceen.

Starre lanzettliche Blätter, immergrün und grundständig. Aus deren Mitte erhebt sich der bis zu 120 cm hohe Blütenstiel mit weissen, fleischigen, glockenartig hängenden Blumen, Juni—Juli.

B. Zwiebelpflanzen.

Allium — Lauch — Liliaceen.

— **azureum**, elegante blaue Blumen auf 40—50 cm hohen Stielen.

— **Molyi**, goldgelbe Blüten dolden im Mai, 20—30 cm.

— **Ostrowskianum** (Syn. *oreophilum*), karminrosa, grossblumig, 10 cm, Mai—Juni.

— **roseum**, weisslichrosa, 40 cm. Mai—Juni.

— **decipiens**.

Bulbocodium vernum — Liliacee.

Reizender Frühlingsblüher, Februar—März, ähnlich einem purpurviolettroten *Crocus*. Rosen und Steingarten.

Chionodoxa — Schneestolz — Liliacee.

— **Luziliae**, 10 cm hohe Blütentrauben von prächtig blauer Farbe, weisse Mitte, März—April.

— **sardensis**, rein dunkelblau, für Alpinum und Unterpflanzung.

Crocus — Safran — Iridaceen.

Bekannte, niedrige Zwiebelpflanze fürs Alpinum, Bordüren, Rasen und Unterpflanzungen.

— **biflorus**, Blätter schmal lineal, weiss gestreift, Blüten aussen lavendelblau mit hellen Streifen, innen weiss oder lila, blüht oft schon im Januar. Steingarten.

— **hyemalis**, hellblau, März.

— **Imperati**, aussen gelb mit 3 lila Streifen, innen violett, Schlund okergelb, eine der Besten für den Steingarten.

— **Medius**, eine der schönsten herbstblühenden Arten, lilapurpur mit dunkelgelbem Stempel und Staubgefässen. September—Oktober.

— **Salzmanni**, zart, blaulila, September—Oktober.

— **sativus**, violett mit Purpurstreifen, Narbe rotorange. Oktober—Nov.

— **Sieberi**, Azurblau, reichblühend, März—April.

— **speciosus**, grossblumig, helllila mit dunklen Adern, Sept.—Oktober.

— **Susianus**, goldgelb, aussen purpurn überlaufen, März.

— **Thomasianus**, lavendelblau mit weissem Schlund, März.

- **versicolor**, lila violett gestreift, Februar—März.
- **zonatus**, helllila mit rotvioletten Adern, September—Oktober.
- **vernus**, die weissen, blauen, gestreiften und gelben Gartenformen sind nur im Herbst lieferbar.

Eranthis — Winterling — Winteraconit — Ranunculaceen.

Die einzelnen gelben Blumen erscheinen kurz nach der Schneeschmelze, olivgrüner Hüllkelch, Blätter erscheinen später, 5—10 cm Februar—April.

- **cilicicus**, grossblumig und früh, sattgelb.
- **hyemalis**, satt schwefelgelb.
- **Tubergenii**, grossblumig, hellschwefelgelb.

Fritillaria — Kaiserkrone — Liliaceen.

- **imperialis**, dichtbeblätterter bis 100 cm hoher Blütschaft, quirlig angeordnete, hängende scharlachrote Blüten. April—Mai.
- **Meleagris**, Schachbrettblume, fleischfarben oder gelblich, mit schachbrettartiger, dunkelbrauner oder schwarzer Zeichnung. 15—25 cm. April—Mai, am besten in halbschattiger Lage.
- — **alba**, reinweiss.

Galanthus — Schneeglöckchen — Amaryllidaceen.

- **nivalis**, gewöhnliches Schneeglöckchen unserer Gärten.
- — **grandiflora**, grossblumig.
- **Elwesii**, grossblumig und sehr früh.

Iris reticulata — Schwertlilie — Iridaceen.

5—15 cm. Blüht kurz nach der Schneeschmelze, mit grossen purpurovioletten Blüten. März—April.

- **hollandica** „**Emperor**“, porzellanblau mit gelb, 30 cm. Juni. Erstklassige Schnittblume.

Lilium — Lilie — Liliaceen.

- **candidum**, weisse Madonnalilie, bekannte weisse Gartensorte.
- **croceum**, Feuerlilie, aufrechte Blumen in Dolden, Mai—Juni, orangerot, 60—80 cm.
- — **erectum**.
- **Henry**, orangegelb, nickende, grosse Blüten, September, bis 2 Meter
- **philadelphicum**, dunkelorange, schwarz gefleckt, nickende Blumen, Halbschatten, 100—150 cm.
- **pyrenaicum rubrum**. Zurückgeschlagene Kronblätter, purpurrot nickende Blüten, 60 cm. Juni.
- — **aureum**, goldgelbe Blüten mit orangeroten Staubgefässen.
- **Martagon**, unsere einheimische Türkenbundlilie, purpur mit zurückgeschlagenen Kronzipfeln, 60—80 cm. Mai—Juni.
- **regale**, trompetenförmige, grosse Blumen, reinweiss, gelb und rosa schattiert. 80—120 cm. Juli—August.

- **speciosum rubrum**, grossblumig, dunkelrosa, karmin getuscht, 70—80 cm. Juni—Juli.
- **album**, weiss,
- **tigrinum** — Tigerlilie unserer Gärten eine der widerstandsfähigsten, orangerot mit schwarzen Flecken, Juli—August, 100—150 cm
- **splendens**, reichblütige Blütenstände, Blüten leuchtend orangefarben mit schwarzen Flecken.

Montbretia crocosmiae flora — Iridaceen.

Gladiolenähnliche Blätter, elegante Stängel von orangefarbenen Blüten, gute Schnittblume, Juli—September.

Muscari — Traubenhyacinthe — Liliaceen.

Lineale Blätter und kopfige Blütenstände, kalkliebend, sonnige Lage, frischer, sandiglehmiger Boden.

- **botryoides**, blau, 10 cm. März—April.
- **alba**, reinweiss.
- **Heavenly Blue**, besonders reichblühende, dunkelblaue Art mit grossen Blütentrauben.

Narcissus — Narzisse — Amaryllidaceen.

- **biflorus**, niedere interessante Art für den Steingarten.
- **triandrus**.
- **poeticus**, weisse Narzisse mit gelb und rotem Auge.
- **ornatus**.
- **pseudo-Narcissus**, gelbe Trompetennarzisse.
- **incomparabilis**.
- **bicolor**.
- **Golden Spur**.
- **Van Sion**.

Scilla — Meerzwiebel — Liliaceen.

- **bifolia**, zweiblättrig, Blütentrauben 3—6 blütig, dunkelblau, 8—10 cm. März—April.
- **nutans**, breitlineale Blätter, Blüten in hängenden Trauben, dunkelblau, 20—30 cm, Mai.
- **alba**, weiss.
- **sibirica**, grossblumig, dunkelblau, nickend 10—15 cm, April.
- **alba**, weisse Abart der Vorigen.

Sternbergia lutea — Gewitterblume — Amaryllidaceen.

Lange, schmale Blätter, goldgelbe crocusähnliche Blüten im September—Oktober. 5—10 cm.

Tulipa — Tulpe — Liliaceen.

- **australis**, gelb, rot getuscht, April—Mai, 30 cm.
 - **Clusiana**, lange schmale Blüten, innen weiss mit bläulicher Mitte, aussen scharlach mit weiss, 30 cm, März—April.
 - **Kaufmanniana**, weissgelb, mit rosa getuscht, grossbl., 20—25 cm, März.
 - **Maryoletti**, hellgelb, rot und rosa getuscht, 25 cm.
 - **sylvestris**, Blüten vor dem Aufblühen nickend, gelb, Mai—Juni.
- Andere Freilandtulpen (einfache Gartensorten): Papagei, Darwin, Breder auf Anfrage im Herbst. Ebenso Hyacinthen etc.

Colchicum autumnale Bornmülleri — Herbstzeitlose — Liliaceen.

Grossblumige Kulturform, violett mit weisser Zone am Grund.

Die meisten hier angeführten Zwiebelgewächse sind in Töpfen oder Drahtkörben kultiviert und können darum das ganze Jahr, selbst in Blüte versandt werden, Frost und grosse Trockenheit ausgeschlossen.

C. Winterharte Freilandfarne.

Zur Bepflanzung schattiger und halbschattiger Stellen unter Bäumen, in Rabatten, im Steingarten, unentbehrliches Pflanzenmaterial. Leichter humoser Boden.

Adiantum pedatum. Venushaar, grosse, feinzerteilte Wedel, dunkelbraune Stiele, 40—50 cm.

Aspidium, siehe *Athyrium* und *Lastrea*.

Asplenium Trichomanes, zierlicher unpaariggefiederter Wedelfarn, dunkelbraune Stiele, für Felsritzen und Trockenmauer, 10 cm.

— **Ruta Muraria**, Mauerraute, einheimischer Mauerfarn.

— **speciosum**.

Athyrium Filix foeminae, feingefiederte Wedel, 60—100 cm.

— — — **corymbiferum**, Wedel am Ende kopfartig verdichtet, capitata Form.

— — — **Craigei**, feingeschlitzte Wedel.

— — — **multifidum**.

— — — **pumilum**, sehr zierliche, niedere, feinwedelige Art.

— — — **simpanosum**.

— **felix mas cristatum**, kammartig endigende hellgrüne Wedel.

Blechnum spicant — Rippenfarn, einheimisch, 20 cm.

Cystopteris asplenioides.

— **fragilis**, Steinfarn, zierlich, feingegliederte Art, für Felsenritzen, Trockenmauer und Alpinum.

Lastrea Filix foeminae linearis.

— — — — **polydactylis**, hahnenkammartig verzweigt.

— **probinqua crispa**.

Onclea sensibilis, gefiederte, hellgrüne Wedel, 40—50 cm.

Osmunda regalis, Königsfarn, breite, hellgrüne Wedel, Sporen am Ende derselben bis 150 cm hoch.

Polypodium (Syn. *Polystichium*) **angulare**, Tüpfelfarn. Wintergrüne, lange schmale Wedel.

— — — **concinnum**.

— — — **grandiceps**, hahnenkammartiger Abschluss der Wedel.

— — — **pumilum**, zierliche feine Art für den Felsengarten.

— — — **scalpum densum**.

— **vulgare**, einheimischer Tüpfelfarn oder „Engelsüss“.

— **proliferum**, neue prächtige Art mit feinzerschnittenen Wedeln.

Selaginella helvetica — Mooskraut, schuppenförmige Blätter, rasig, nur für feuchte Lage im Alpinum.

— **Willkommii**.

Scolopendrium vulgare — Hirschzunge.

Struthiopteris germanica — Straussfarn, zierliche, grosse Wedel.

D. Gehölze.

Amelanchier botrycarpum, hängende, weisse Blütentrauben, heidelbeerartige Früchte.

Arctostaphylos alpina, niederliegender Felsenstrauch, mit scharlachroter Herbstfärbung.

Aralia spinosa.

Azalea — Azalee — Ericaceen.

- **procumbens**, Alpenazalea, siehe Loisleuria-Stauden.
- **mollis**, 50—60 cm, rot orange, gelb, weiss.
- **pontica**, wintergrün.
- **hybrida**, immergrün, dunkelrot.

Berberis — Berberitze — Berberidaceen.

- **buxifolia nana**, immergrüner kugeliger Busch, Blüten gelb, 30 cm.
- **candidula**, glänzende, lange, immergrüne Blätter, 20 cm, gelb.
- **Darwini**, immergrün, zierliche Art für Alpinum, 40 cm, gelb.
- **Gagnepaini**, prächtige immergrüne langblättrige Art, 100 cm.
- **Hookeri compacta**, grosse glänzende, tiefgrüne Belaubung, grosse Stacheln, immergrün.
- **Irwini**, hellgrüne, rötlich überlaufene Blätter, immergrün.
- **Knighti**, grossblättrig, grosse rotbraune Dornen, immergrün.
- **leucophyllus**, immergrüne Zwergsorte, Blattunterseite blau bereift.
- **pruinosa**, grossblättr., jeweils 3 grosse Dornen zusammen, immergrün.
- **Regelliana**.
- **Dielsiana**.
- **stenophylla**, schmale, blaugrüne Blätter, immergrün, Blüten orange.
- **subcauleolata**, laubabwerfend, breitwachsend, überhängend.
- **Thunbergi**, laubabwerfend, prächtig orange in der Herbstfärbung.
- **atropurpurea**, dunkelrotes Laub vom Austrieb an.
- **vulgaris und vulgaris atropurpurea**.
- **verruculosa**, prächtige, niedere kompakte, immergrüne Art.
- **Wilsonae**. Besonders schön im Schmuck der korallenroten Beeren.

Betula alba, Weissbirke.

- **papyrifera**. Amerikanische Papierbirke.
- **lutea**, gelbe Birke.
- **nana**, Zwergstrauch fürs Alpinum mit kreisrunden Blättchen.

Buddleia amplissima, — Scheinflieder, raschwachsend, blaue Blütenrispen

- — **superba**, dunkelblau.
- — **magnifica**.
- **Veitchiana**, wohlriechend.

Buxus Handworthi, blaugrün, Blätter kreuzständig.

- **sempervirens**, schmalblättrig, dunkelgrün.
- **rotundifolius**, rundblättrig.
- **latifolius**, breitblättrig.

Ceanothus floribundus „Gloire de Versaille“, 1 Meter, blaue Blütenrispen

Cornus sanguinea, rotholziger Hartriegel.

- **alba Späthii**.

Corylus Avellana, Haselnuss.

— — *atropurpurea*, Bluthasel.

Cotoneaster — Felsenmispel — Rosaceen; wertvolle Sorten, zum Teil immergrün, für den Steingarten, die grösseren für den nat. Garten.

— *adpressa*, niederliegend, Blatt leicht gewellt, sommergrün.

— *buxifolia*, immergrün, sparriger Wuchs, dunkelrote Beeren.

— *congesta*, immergrün, den Steinen ganz eng anschmiegend.

— *Franchetti*, leichte, elegante Art mit überhängenden Zweigen, 80 cm.

— *horizontalis*, breit ausladende Aeste, zinnoberrote Beeren.

— *humifusa* (Dammeri), kriechend, grossblättrig, immergrün, prima.

— *microphylla*, kleinblättrig, immergrün, grosse dunkelrote Beeren.

— *moupinensis*, prächtiger Deckstrauch, 200 cm.

— *prostrata*, niederliegend, immergrün.

— *rugosa Henryi*, lange Blätter. Zweige überhängend, immergrün.

— *salicifolia floccosa*, ähnlich der Vorigen, beide breit ausladend.

— *Simonsi*, aufrechter Wuchs, bis 150 cm, zinnoberrote Beeren.

— *thymifolius*, immergrün, fürs Alpinum, Blüten reinweiss.

— *Zabeli*, schwarzbraunes Holz, elegant überhängende Zweige.

— *Dielsiana* (Applanata).

Colutea orientalis — Niedriger Blasenstrauch, gelbe Schmetterlingsblüte.

Cydonia japonica, Feuerbusch.

— — *Maulei*.

Cytisus laburnum, gewöhnlicher Goldregen.

— *elongatus*, 80 cm hoher Strauch für sonnige Lage, goldgelb.

— *decumbens*, niederliegend, goldgelb, 10 cm, nur für Alpinum, sonnig.
Andere Sorten siehe Genista.

Calluna vulgaris alba, weisse Abart der echten Heide.

— — *nana*, moosartiges Polster, dicht, kompakter Wuchs, heilrosa.

— — *prostrata*, niederliegend, purpurrosa.

Daphne Cneorum, immergrüner, niederliegender Seidelbast, leuchtend rote Blüten in endständigen Köpfchen, starker Duft, sonnig.

— *Mezereum alpinum*, nied., kompakte Art unseres Waldseidelbastes.

Deutzia crenata, guter Deckstrauch mit weissrosa Blütenglockchen.

— — *alba*, reinweiss.

— — — *fl. pl.*, reinweiss gefüllt.

— — *rosea*, rosa.

— — *rosea fl. pl.*, rosa gefüllt.

— *discolor*, schwächer wachsende Art, zur Randpflanzung des Steing.

— *gracilis*. Niedere zierliche Form, 50 cm.

— — *rosea*.

— — *scabra*.

Diervilla rosea — Weigelia, grosse rosa Blütenglocken, dekorative Belaubg.

— — *Chamaeleon*, guter Deckstrauch.

— — *Saturn*.

Ephedra. Seltene Felsenpflanze mit schachtelhalmartigem Wuchs, zur Familie der Coniferen gehörend, heisse, trockene und steinige Lage.

— *procera*.

— *sikkimensis*.

— *vulgaris*.

- Erica** — Schneeheide — Ericaceen. Moorbeetpflanzen und Alpinum.
- **carnea**, nadelförmige Blätter, rote Blüten, oft schon im Dez. blühend
 - — **alpina**.
 - — **hybr. rosea**, hellrot.
 - — — **praecox rosea**, frühblühend, vollblühend, heller als Stammf.
 - — **nana compacta**, niederliegender kompakter Wuchs,
 - **mediterranea**, strauchartige Erika aus dem Mittelmeergebiet, rosa.
 - **stricta**, straffer Wuchs, blüht Juni—Juli, dunkelrot, sehr hart.
 - **vagans**, volle grosse Blütenrispen, Juni—Juli, purpurrosa.
 - — **alba**, weiss.
 - — **rubra**, dunkelrot.

- Evonymus** — Spindelbaum, harte, niederliegende Sträucher für Gruppen oder Alpinum.
- **Kewensis**, Zwergform, dunkelgrün, für Steingarten und Trockenmauer.
 - **radicans**, halb kletternd, grün mit hellen Adern, trocken und heiss.
 - — **fol. var. argent.**, weiss panaschierte Belaubung, auch zu Bord.
 - — „**Silver King**“, grossblättrig, Blätter fast weiss.
 - **verrucosa**, als Unterpflanzung, Schattenstrauch, oder kleine Hecke.
 - **vetulus**, olivgrüne Blätter, niederliegend, breit, guter Schattenstrauch

- Forsythia Fortunei**, Blüten goldgelb, im Frühling vor dem Laub.
- **Sieboldi**, schwach wachsend.
 - **suspensa**, überhängend.
 - **viridissima**, aufrechter Wuchs.

Eleagnus Edulis, Unterseite der Blätter silberig.

- Genista** — Ginster — Papilionaceen. Reizende Felsensträucher für sonnig-heisse Lage und steinigen durchlässigen Boden.
- **hispanica**, stachelig-starre Polster, gelbblühend.
 - **pilosa**, zierliches, 50 cm hohes Sträuchlein mit gelben Blüten.
 - **sagittalis**, lockerrasiger Wuchs, Stengel geflügelt, goldgelb, 20 cm
 - **radiata**, steifes, graugrünes Polster, braungelbe Blüten
 - **scoparia Andreana**, Besenginster, Blüten goldgelb mit rotbraun.
 - **praecox**, hellschwefelgelber Besenginster, prächtiger Zwergstrauch.
 - **scop. Butterfly**.
 - — **Daisy Hill**, rosa.
 - — **Dallimorei**.
 - **tinctoria fl. pl.**, gefüllter Färberginster.
 - **germanica**, deutscher Ginster mit gelben Blüten, 20 cm.

- Hedera laciniata**, tief ausgeschnittener Epheu, sehr zierl. Art fürs Alpinum
- **conglomerata**, nicht rankende, blaugrüne Art für den Steingarten.
 - **nana**.

Hedysarum caucasicum, Süssklee, blauviolett, 30 cm. Halbschatten.

- Jasminum Beesianum**, Halbschlinger, Blüten rosa, Winterschutz.
- **nudiflorum**, goldgelb, blüht oft schon November—Dezember.
 - — **fol. var.**, panaschiertes Laub.
 - **officinale album**, fiederschnittiges Laub, weiss wohlriechend.

Ilex Pernyi, zwergiges Stechlaub, 40 cm hoch.

Amorphafruticosa, Schein-Indigo, blaue Blütenrispen.

Hydrangea arborescens, Freilandhortensie mit runden Blütenballen.
— *paniculata*, längliche, grosse Blütentrauben.

Kerria japonica fl. pl. Ranunkelstrauch, goldgelb gefüllte Blüten.

Leyophyllum buxifolium, immergrünes Moorbeetgewächs aus Amerika, hell-rosa, Blütenköpfchen, endständig an den Trieben, 25 cm.

Ligustrum vulgare und *ovalifolium*, als Einzelpflanzen oder zu Hecken.

Lonicera, Gaisblatt, immergrüne Sträuchlein von grossem Zierwert.

— *nitida*, pyramidaler Wuchs, ähnlich einer Myrthe, 80 cm.

— *pileata*, als Einzelpflanze im Felsengarten, Böschungspflanze, oder Bordüre, verträgt Schatten und das Tropfen unter Bäumen noch sehr gut.

— *nitida* x *pileata*, aufrechter Wuchs, wertvolle Immergrüne.

Mahonia aquifolia.

Medicago arborea, strauchartiger Sichelklee aus Spanien, nur geschützte Lage.

Olearia numularifolia, interessantes Zwergsträuchlein mit runden, immergrünen Blättchen, Blüten weiss, 20 cm.

Philadelphus coronarius — Zimmtröschen.

— — *grandiflorus*.

— — *latifolius* Souv. de Billard.

— — *Lemoinei*, nieder, kompakt.

— — *compacta*.

— — *erectus*.

— — *Wegheri*.

Potentilla dahurica, holziges, niederliegendes Fingerkraut, weiss, 10 cm.

— *fruticosa*, dichte Büsche, gelb.

— *Friederichseni*, sattschwefelgelb.

— *Veitchi*, gedrungener kompakter Wuchs, reinweiss.

— *mandschurica*.

Prunus laurocerasus — Kirschlorbeer.

— — *Schipkaensis*, schmalblättrige, harte Art.

— — *Zabeliana*.

— *serrulata* „Shida-re Sakura“, gefüllte, hängende Zierkirsche auf Stämmchen.

Ribes floribundum, rosablühende Zier-Johannisbeere.

— *alpinum*, niedere, feinholzige, sehr harte Art.

— *sanguineum*, dunkelkirschrote, hängende Blütentrauben.

Rhododendron catawbiense und grossblumige Hybriden.

— *hirsutum*, behaarte Alpenrose unserer Alpen.

Rosa alpina, dunkelrosa, einfach, fast dornenlos.

— *rubiginosa magnifica*.

— *rubrifolia*, blau und purpurrot bereiftes Laub.

Salix — Weide. Es folgen hier eine Reihe ausschliesslich niederer alpiner Gletscherweiden, für feuchte, steinige Lage im Alpinum.

— *arbuscula*, blaugrüne Blätter, bis 50 cm hoch.

— *glauca*, breitblättrig, blaugrün, Unterseite der Blätter weissfilzig, 50 cm.

— *herbacea*, ganz niederliegende, rasige Form, kleine, kreisrunde Blättchen, 3—5 cm.

- **reticulata**, grossblättrig, netzaderig, Blätter derb lederig. Unterseite weissfilzig, niederliegend, rasig ausgebreitet, 5 cm.
- **retusa**, niederliegend, dichtrasige Art mit langen, dem Boden sich anschmiegenden Trieben, 5 cm.
- **microphyllus**, knorrig wachsend, dichtrasig, ganz kleinblättrig, 5 cm.
- **Cotteti**, lanzettlich glänzend, hellgrüne Blätter, gelbbraunes Laub, 30—40 cm hoch.
- **rosmarinifolius**, olivgrüne, schmallanzettliche Blätter, Holz rotbraun
- **vitellina pendula nova**, Goldhängeweide, Stämme.
- **babylonica pendula**.

Spiraea albiflora, prächtiger Deck- und Blütenstrauch, reinweiss.

- **arguta**, doldige purpurrosa Blütenstände.
- **Bumalda**, niedere, kompakte Art, für Vorpflanzungen, Böschung, etc.
- — **alba**, weiss.
- — **Anthony Waterer**, nieder, dunkelkirschrote Dolden, Laub hin und wieder weiss panaschiert, eine der Besten.
- **canescens**.
- **decumbens**, zierliche, winzige Art für den Steingarten, 5—10 cm hoch reinweisse Blütendolden.
- **Douglasi**, kirschrote Blütenrispen, 150 cm.
- **Hacquetti**, ähnlich decumbens. 10 cm, hellgrüne Blättchen.
- **hyperacifolia**, halbhohe, zierliche Art für den Steingarten.
- **japonica**, breite, grosse Blütendolden auf bis 180 cm hohen Trieben.
- — **atrosanguinea**, dunkelrot.
- **opulifolia**, hängende, weisse Dolden.
- — **aurea**, gelbgrüne Belaubung.
- **paniculata alba**, weisse rispige Blütenstände.
- — **rosea**, dunkelrosa.
- **Reevesiana**, schmal- und kleinblättrig, reinweiss gefüllt.
- **sorbifolia**, unpaarig gefiederte Blätter, weiss.
- **Thunbergi**, schmallanzettliche Blätter.
- **Van Houttei**. Eine der besten, dreilappige, blaugrüne Blättchen, grosse, reinweisse, duftende Blütendolden.

Symphoricarpus racemosus — Schneebeere, sehr hart, bis 1800 m. ü. M.

- **orbiculatus**, rotfrüchtig.

Syringa — Flieder.

- **grandiflora**, grossblumig, weiss.
- **hybr. „The President“**, dunkelblau.
- — **Pres. Crevy**, rotviolett.
- — **alba grandiflora**, weiss.
- — **Mme. Lemoine**, weiss gefüllt.
- — **L. Späth**, dunkelrotviolett, grossblumig.
- — **Hugo Koster**, dunkelviolett.
- **Swaynizonia hybrida**, feines Holz und elegante lila Blütentrauben.

Spartium junceum — (syn. *Genista juncea*) ähnlich dem Besenginster, fast blattlos, Stengel blaugrün, ohne Kanten, Blumen leuchtend goldgelb, für sonnige heisse und steinige Lage im Alpinum.

Tamarix hispida, spanische Tamarisze, olivgrüne, feine Belaubung, Blüten in schleierartigen dunkelrosa Ständen. Sonnig und warm. Durchlässiger Boden.

Vaccineum Vitis Ideae, Preisselbeere, dankbares, immergrünes Sträuchlein für halbschattige Lage im Alpinum.

Viburnum Opulus sterile, Schneeballstrauch.

— **utile**, immergrüner Zwergstrauch mit glänzendem Laub und hellrosa Blüten.

E. Zwergkoniferen.

Chamaecyparis Lawsoniana nana glauca compacta. Scheincypresse, dunkelblaugrün, dichter kompakter Wuchs.

— **obtusa nana gracilis aurea**, gelbbunte Art.

— **pisifera filifera**, fadenförmig überhängende Zweige.

— — — **aurea**, gelbe Abart.

Juniperus alpinus, nadelförmiger, blaugrüner niedergestreckter Wachholder aus dem Engadin.

— — **prostratus**.

— **alba spica**, weissgelber Austrieb.

— **procumbens**, dunkelblaugrün, kriechend.

— **Sabina, tripartita, tamariscifolia**, wegen Gitterrost vernichtet.

— **hybernica**, Säulenwachholder.

Picea — Rottanne.

— **excelsa nana**, breitausladend.

— — **Maxwelli**, dicht-kompakter Wuchs, mehrere Gibeltriebe.

— — **Remonti**, streng konischer Wuchs.

— **pungens glauca Kosteri**, langnadlige Blautanne.

Pinus — Föhre.

— **Cembra** — Arve.

— **montanus**, Bergföhre.

— — **Mughus**, richtige Latsche oder Legföhre mit kurzen Trieben.

— — **Pumilio**, Krummholz, Legföhre.

Taxus baccata, Eibe.

— — **hybernica**, Säuleneibe.

— — — **aurea**, gelbbunte Abart.

— — **cuspidata brevifolia**, ausgebreiteter Wuchs, dunkelgrün, steife kurze Nadeln.

— — **repandens**, überhängende Aeste, lange weiche Nadeln, eine der besten Zwergformen.

Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum, für Hecken.

— — **globosa**, kugelig Wuchs.

— — **fastigiata**, Säulenthuya.

— — **recurvata nana**, lockerkugelige Zwergform.

— — **umbraculifera**, dichte feste Halbkugeln bildend.

Tsuga canadensis — Canadische Hemlockstanne.

F. Schlingende Gehölze.

Ampelopsis quinquefolia. Wilder Wein, Jungfernrebe.

- *muralis*. Blatt fingerförmig geteilt, wie bei der Vorigen, leicht behaart, Selbstklimmer.
- **Veitchi**, japanischer wilder Wein, Selbstklimmer, ungeteilte Blätter, prächtige Herbstfärbung.

Aristolochia Siphon. Pfeifenstrauch, grosse, dunkelgrüne Blätter, für Lauben

Clematis — Waldrebe.

- *montana*, raschwachsend, mittelgrosse, weisse Blütensterne in reicher Fülle.
- — *rubens*, grossblumig, rosa.
- *paniculata*, Unmenge kleiner, weisser Blütensterne
- *Viticella*, dunkelpurpurviolett.
- *hybr. Jackmanni*, grossblumig, dunkelblau.
- — — *alba*, grossblumig, weiss.
- — **The President**, dunkelazurblau.
- — *Ville de Lyon*, dunkelviolett.

Glycinie (*Wistaria*) *chinensis*, grossblumig, blaue Glycinie.

Hedera helix, Epheu, gross- und kleinblättrig.

Lonicera — Gaisblatt.

- *brachypoda* (*reticulata*) **aurea**, kleinblättriges reizendes Gaisblatt, netzaderig, goldgelb panaschiert.
- *Caprifolia*.

Polygonum Auberti, schlingender Knöterich mit rosaweissen Blumen.

Rosa Banksiana — Schlingrosen in vielen Sorten.

G. Jap. Ahorn.

Acer dissectum, Zwergform mit überhängenden Zweigen, hellgrünes, feingeschlitztes Laub.

- — *atropurpureum*, Belaubung das ganze Jahr rot.
- — *polymorphum atropurpureum*, dekorative, rotblättrige Büsche.

